

Партизанский филиал
краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Владивостокский базовый медицинский колледж»

Материалы
для самоподготовки студентов к промежуточной аттестации
специальность 34.02.01. Сестринское дело
4 курс
МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях
в акушерстве и гинекологии: экзамен

Рассмотрено на ПЦК Клинических дисциплин

Протокол № 3 от «12» ноября 2019 г.

Составил: Атюшева Галина Алексеевна

Правильный ответ под «А»

1.ШЕВЕЛЕНИЕ ПЛОДА У ПОВТОРНОБЕРЕМЕННЫХ ОЩУЩАЕТСЯ НА СРОКЕ

- А) 8 недели Б) 22 недель В) 19-20 недель Г) 24 недели

2.ОПРЕДЕЛИТЕ СРОК РОДОВ ПО НЕГЕЛЕ, ЕСЛИ ПОСЛЕДНЯЯ МЕНСТРУАЦИЯ У ЖЕНЩИНЫ БЫЛА 1 АПРЕЛЯ

- А) 8 января Б) 8 марта В) 8 февраля Г) 18 марта

3.ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД НАЧИНАЕТСЯ

- А) с 22 недель беременности Б) с 30 недель В) с 32 недель Г) с 12 недель

4.СРОК РОДОВ ПО ФОРМУЛЕ НЕГЕЛЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

А) от первого дня последней менструации отнимается 3 месяца и прибавляется 7 дней

Б) в первый день шевеления плода прибавляется 22 недели

В) от дня последней менструации отнимается 2 месяца и прибавляется 7 дней

Г) в первый день последней менструации прибавляется 9 месяцев

5. К АКУШЕРСКОМУ МЕТОДУ НАРУЖНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОТНОСИТСЯ

А) кетод Леопольда – Левицкого

В) метод Негеля

Б) метод Жордания

Г) метод Рудакова

6.ПРЕДВЕСТНИКИ РОДОВ

А) опускается дно матки

В) учащается шевеление плода

Б) отхождение околоплодных вод

Г) беременность достигает до 39-40 недельного срока

7.СОСТОЯНИЕ НОВОРОЖДЕННОГО ОЦЕНИВАЕТСЯ

А) по шкале Апгар

В) по Персианинову

Б) по шкале Виттлингера

Г) по Леопольду

8.ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ НОВОРОЖДЕННОГО СОСТАВЛЯЕТ

А) 1 месяц

Б) 1-2 недели

В) 4-5 дней

Г) 1-2 дня

9.КАК НАЗЫВАЕТСЯ ТРЕТИЙ ПЕРИОД РОДОВ

А) период рождения последа

В) рождение плода

Б) через 2 часа после родов

Г) потужной период

10.ШЕВЕЛЕНИЕ ПЛОДА У ПЕРВОБЕРЕМЕННЫХ ОЩУЩАЕТСЯ НА СРОКЕ

А) 20 недели

Б) 16-18 недель

В) 24 недель

Г) 26 недель

11 .ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДЕКСА СОЛОВЬЕВА ИЗМЕРЯЕТСЯ

А) окружность запястья

В) поперечный размер малого таза

Б) прямой размер малого таза

Г) окружность таза

12.СРОКИ ИСТИННОГО ПЕРЕНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ?

А) 42 и более недели

Б) 37-38 недель

В) 40-41 неделя

Г) 39-40 недель

13.ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПРИБАВКА ВЕСА БЕРЕМЕННОЙ ПОСЛЕ 30 НЕДЕЛЬ

А) до 1 кг

Б) до 3 кг

В) 600,0

Г) 500,0

14.ПРИЗНАК КРУПНОГО ПЛОДА

А) высота дна матки больше 40 см

В) многорожавшая беременная

Б) беременность больше 42 недель

Г) крупный размер головки

15. НА КАКОМ СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ ВЫСОТА ДНА МАТКИ СОСТАВЛЯЕТ 32 СМ

- А) 30 недель Б) 26 недель В) 24 недели Г) 36 недель

16. РАННИЙ НЕОНАТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ДЛИТСЯ

- А) до 1 недели после родов В) с 28 недель беременности до рождения плода
Б) период рождения плода Г) с рождения новорожденного до 23 часа 59 минут

17. ФОРМА ШЕЙКИ МАТКИ У НЕРОЖАВШИХ ЖЕНЩИН

- А) конусовидная В) округлой формы
Б) у всех женщин конусовидная Г) цилиндрическая

18. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ БЕРЕМЕННОСТИ В НОРМЕ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 40 недель Б) 40-42 недели В) 36-42 недели Г) 32-40 недели

19. ГИПОТАЛАМУС ВЫРАБАТЫВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ГОРМОНЫ

- А) рилизинг-факторы Б) гонадотропины В) гестогены Г) эстрогены

20. УКАЖИТЕ ПРЕДЛЕЖАЩУЮ ЧАСТЬ ПРИ ЧАСТИЧНОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ ПЛАЦЕНТЫ

- А) рядом с плодным пузырем плацентарная ткань В) плодный пузырь
Б) мясистая ткань Г) головка

21. НОРМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД ПРИ ДОНОШЕННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ.

- А) 0,5 - 1,5 литра Б) 5 - 6 литров В) более 6 литров Г) 3 - 4 литра

22. ФСГ СТИМУЛИРУЕТ

- А) рост фолликулов в яичнике В) все перечисленное
Б) продукцию кортикостероидов Г) продукцию ТТГ в щитовидной железе

23. ДОСТОВЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) выслушивание сердцебиения плода В) отсутствие менструации
Б) пигментация кожных покровов Г) увеличение плода

24. К ОСНОВНОМУ ПРИЗНАКУ АНАТОМИЧЕСКОГО УЗКОГО ТАЗА ОТНОСИТСЯ

- А) уменьшенный размер наружной конъюгаты В) крупное телосложение
Б) маленький размер индекса Соловьева Г) рост беременной 150 см

25. ПОЛОЖЕНИЕ ПЛОДА — ЭТО

- А) отношение оси плода к длиннику матки
Б) отношение спинки плода к фронтальной плоскости
В) отношение оси плода к поперечнику матки
Г) отношение спинки плода к сагиттальной плоскости

26. ПРАВИЛЬНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ПЛОДА СЧИТАЕТСЯ

- А) продольное В) поперечное с головкой плода, обращенной вправо
Б) косое Г) поперечное с головкой плода, обращенной влево

27. СЕРДЦЕБИЕНИЕ ПЛОДА ПРИ 1 ПОЗИЦИИ ВЫСЛУШИВАЕТСЯ

- А) слева от пупка Б) над лоном В) справа от пупка Г) выше пупка

28. ДИСТАНЦИЯ СПИНАРУМ РАВНА

- А) 25-26 см Б) 28-29 см В) 30-31 см Г) 20-21 см

29. ДИСТАНЦИЯ ТРОХАНТЕРЙКА РАВНА

- А) 30-31 см Б) 20-21 см В) 25-26 см Г) 28-29 см

30. РАЗМЕР НАРУЖНОЙ КОНЪЮГАТЫ

- А) 20-21 см Б) 28-29 см В) 30-31 см Г) 25-26 см

31. В СОСТАВ ПОСЛЕДА ВХОДИТ

- А) плацента, пуповина и оболочки плода В) плацента и пуповина
Б) плаценты и оболочки Г) плацента

32. СИМПТОМЫ ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ КЛИНИЧЕСКИ УЗКОГО ТАЗА

- А) правильно выраженная конфигурация головки, продолжительные роды
Б) нарушается сердцебиение плода
В) симптом Вастена "вровень"
Г) внутриутробная гипоксия плода

33. ГРАВИ-ТЕСТ ОСНОВАН НА

- А) определение хорионгонадотропина в моче В) определение срока овуляции
Б) определение скрытых отеков Г) определение экскрадиола в моче

34. ФСГ ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ В

- А) передней доле гипофиза Б) плаценте В) яичниках Г) гипоталамусе

35. ЗА РАЗВИТИЕ ФОЛЛИКУЛОВ В ЯИЧНИКАХ ОТВЕТСТВЕННЫ ГОРМОНЫ

- А) ФСГ Б) рилизинг фактор ФСГ В) эстрогены Г) пролактин

36. МЕСТО ВЫСЛУШИВАНИЕ СЕРДЦЕБИЕНИЯ ПЛОДА ПРИ 2 ПОЗИЦИИ

- А) справа от пупка Б) выше пупка В) над лоном Г) слева от пупка

37. ПОЗИЦИЯ ПЛОДА ПРИ ПОПЕРЕЧНОМ ПОЛОЖЕНИИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО РАСПОЛОЖЕНИЮ

- А) головки Б) мелких частей В) тазового конца Г) спинки

38. ПРЕДЛЕЖАНИЕ ПЛОДА - ЭТО ОТНОШЕНИЕ

- А) крупной части плода ко входу в малый таз В) головки плода ко дну матки
Б) головки плода ко входу в таз Г) тазового конца плода ко входу в малый таз

39. ИСТИННАЯ КОНЪЮГАТА - ЭТО РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ

- А) наиболее выступающими внутрь точками симфиза и мысом
Б) нижним краем симфиза и выступающей точкой мыса
В) Верхним краем симфиза
Г) серединой верхнего края лонного сочленения и мысом

40. ДОСТОВЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) сердцебиение плода В) отсутствие менструации
Б) диспепсические нарушения Г) увеличение размеров матки

41. ПЕРВЫМ ПРИЕМОМ НАРУЖНОГО АКУШЕРСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

- А) высота стояния дна матки В) вид плода
Б) предлежащая часть Г) позиция плода

42. ОКРУЖНОСТЬ ЖИВОТА ИЗМЕРЯЕТСЯ НА

- А) уровне пупка
Б) середине расстояния между пупком и мечевидным отростком
В) 3 поперечных пальца ниже пупка
Г) середине расстояния между пупком и лонным сочленением

43. ДЛЯ ТАЗОВОГО ПРЕДЛЕЖАНИЯ ПРИ НАРУЖНОМ АКУШЕРСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ НЕ ХАРАКТЕРНО

- А) баллотирующая часть над входом в малый таз В) баллотирующая часть в дне матки
Б) низкое расположение дна матки Г) высокое расположение дна матки

44. КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕЛОЙ ОСТРОЙ ГИПОКСИИ ПЛОДА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) аритмия В) сердцебиение плода 120-140 уд./мин
Б) глухость тонов сердца плода Г) сердцебиение плода 100-110 уд./мин

45. ТЯЖЕСТЬ ТОКСИКОЗА 1-Й ПОЛОВИНЫ БЕРЕМЕННОСТИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- А) ацетонурией Б) гипертензией В) диареей Г) увеличением массы тела

46. ПРИ ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ НОВОРОЖДЕННОГО НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ

- А) состояние зрачков Б) сердцебиение В) мышечный тонус Г) дыхание

47. ПРИ ДЛИТЕЛЬНОСТИ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА 28 ДНЕЙ ЕГО СЛЕДУЕТ СЧИТАТЬ

- А) нормопонирующим В) гипопонирующим
Б) антепонирующим Г) постпонирующим

48. НАЛИЧИЕ АКТИВНОГО РЕВМАТИЗМА ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ

- А) ухудшает прогноз ее течения В) облегчает ее течение
Б) не влияет на ее исход Г) не является фактором риска гестоза

49. ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ПОЗДНЕГО ГЕСТОЗА БЕРЕМЕННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) гипертоническая болезнь В) поперечное положение плода
Б) возраст первородящей 25 лет Г) вторая беременность

50. ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ РАННИХ СРОКОВ БЕРЕМЕННОСТИ НАИБОЛЕЕ ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ

- А) оценка вероятных признаков беременности
Б) интерпретация данных влагалищного исследования
В) проведение иммунологических тестов на беременность
Г) оценка сомнительных признаков беременности

51. ДИСФУНКЦИОНАЛЬНОЕ МАТОЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ - ЭТО:

- А) кровотечение при дисфункции гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы
Б) кровотечение при опухоли матки
В) кровотечение при аденомиозе

52. СЛУЖАТ ЛИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ПРИ ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ ТЯЖЕЛОЕ СОСТОЯНИЕ БОЛЬНОЙ, ПАДЕНИЕ АД И СЕРДЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЭКСТРЕННОГО ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА?

- А) нет Б) да В) не всегда

53. ЛЕЧЕНИЕ АНЕМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ АПОПЛЕКСИИ ЯИЧНИКА:

- А) хирургическое
Б) применение антипростагландинов
В) антибактериальное

54. ПРИ РАЗРЫВЕ МАТОЧНОЙ ТРУБЫ КРОВЬ СКАПЛИВАЕТСЯ:

- А) в дугласовом пространстве Б) в переднем своде влагалища В) во влагалище

55. ПРИ ТРУБОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ МЕНСТРУАЦИИ:

- А) отсутствуют Б) циклические В) нерегулярные

56. ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МИОМЫ МАТКИ:

- А) доброкачественная гормонально-зависимая опухоль В) часто встречается в пубертатном возрасте
Б) склонна к малигнизации Г) все выше перечисленное верно

57. СИМПТОМЫ ТРУБНОГО АБОРТА:

- А) схваткообразные боли внизу живота
Б) внутреннее кровотечение
В) метеоризм

58. ФИБРОМИОМА РАСТЕТ ПРИ:

- А) высоком содержании эстрогенов В) высоком содержании прогестерона
Б) низком содержании прогестерона Г) низком содержании всех гормонов

59. ПРОГРЕССИРУЮЩИЙ АТРОФИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ВУЛЬВЫ, ТРЕЩИНЫ, ИЗЪЯЗВЛЕНИЯ, ЗУД ВУЛЬВЫ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ:

- А) лейкоплакии Б) остроконечных кондилом В) рака Г) эктопии шейки матки

60. РАК ШЕЙКИ МАТКИ ЧАЩЕ ВОЗНИКАЕТ:

- а) при лейкоплакии шейки матки с дисплазией в) у нерожавших женщин
б) при эрозии шейки матки г) при истмико-цервикальной недостаточности

61. ГИПЕРПОЛИМЕНОРЕЯ, ХРОНИЧЕСКАЯ АНЕМИЯ, БЕСПЛОДИЕ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ:

- А) эндометриоза В) туберкулеза гениталий
Б) метроэндометрита Г) миомы матки

62. ОСНОВНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СИМПТОМ ПОДСЛИЗИСТОЙ МИОМЫ МАТКИ:

- А) меноррагия В) хроническая тазовая боль
Б) альгодисменорея Г) вторичное бесплодие

63. БОЛИ ПЕРЕД И ВО ВРЕМЯ МЕСЯЧНЫХ, КРОВЯНИСТЫЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ДО И ПОСЛЕ МЕСЯЧНЫХ, БЕСПЛОДИЕ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ:

- А) эндометрита Б) туберкулеза гениталий В) полипа шейки матки Г) миомы матки

64. ЗУД, ОБИЛЬНОЕ ТВОРОЖИСТОЕ ВЫДЕЛЕНИЕ ИЗ ПОЛОВЫХ ПУТЕЙ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ:

- А) кандидоза Б) гонореи В) хламидиоза Г) трихомониаза

65. УЧАЩЕННОЕ БОЛЕЗНЕННОЕ МОЧЕИСПУСКАНИЕ, ЖЖЕНИЕ, ГНОЙНЫЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ИЗ ПОЛОВЫХ ПУТЕЙ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ:

- А) гонореи Б) трихомониаза В) молочницы Г) сифилиса

66. ВОСХОДЯЩАЯ ГОНОРЕЯ ЭТО ПОРАЖЕНИЕ:

- А) маточных труб В) уретры
Б) канала шейки матки Г) парауретральных желез

67. У ЖЕНЩИН ДЕТОРОДНОГО ВОЗРАСТА ГОНОКОК ПОРАЖАЕТ:

- А) цервикальный канал Б) влагалище В) вульву Г) матку

68. ВТОРУЮ СТЕПЕНЬ ЧИСТОТЫ ВЛАГАЛИЩНОГО СОДЕРЖИМОГО ХАРАКТЕРИЗУЕТ:

- А) единичные лейкоциты В) лейкоциты в большом количестве
Б) палочки Додерлейна Г) щелочная среда

69. ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫЙ ПУТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГОНОРЕИ:

- А) гематогенный Б) лимфогенный В) контактный Г) интраканаликулярный

70. ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ НОРМАЛЬНОЙ СРЕДЫ ВЛАГАЛИЩНОГО СОДЕРЖИМОГО НЕОБХОДИМО:

- А) достаточное содержание эстрогенов в организме В) кокковая влагалищная флора
Б) обильные слизистые выделения Г) отсутствие половой жизни

71. НОРМАЛЬНАЯ ФЛОРА ВЛАГАЛИЩА:

- А) палочки Дедерлейца Б) эпителиальные клетки В) кишечные палочки

72. ФУНКЦИЯ МАТКИ:

- А) менструальная Б) секреторная В) выделительная

73. НАРУЖНАЯ ОБОЛОЧКА МАТКИ:

- А) периметрий Б) параметрий В) миометрий

74. СЛИЗИСТАЯ МАТОЧНЫХ ТРУБ ВЫСТЛАНА ЭПИТЕЛИЕМ:

- А) мерцательным Б) многослойным плоским В) кубическим

75. В ЯИЧНИКАХ ОБРАЗУЮТСЯ:

- А) яйцеклетка и женские половые гормоны Б) сперматозоиды В) ферменты

76. ФУНКЦИИ ЯИЧНИКОВ:

- А) эндокринно-гормональная Б) выделительная В) защитная

77. КРУГЛЫЕ СВЯЗКИ МАТКИ ОТКЛОНЯЮТ МАТКУ:

- А) кверху, кпереди Б) кзади, книзу В) кзади

78. ПЕРВАЯ МЕНСТРУАЦИЯ У ДЕВОЧЕК (МЕНАРХЕ) В НОРМЕ НАЧИНАЕТСЯ В ВОЗРАСТЕ:

- А) 11-13 лет Б) 16-17 лет В) 8-9 лет

79. МАТОЧНАЯ АРТЕРИЯ ОТХОДИТ ОТ:

- А) внутренней подвздошной артерии Б) наружной подвздошной артерии В) аорты

80. ПРИ ТРУБНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ МЕНСТРУАЦИИ:

- А) отсутствуют Б) циклические В) ациклические

81. ВАЖНУЮ РОЛЬ В РЕГУЛЯЦИИ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА ИГРАЮТ:

- А) гипоталамо-гипофизарная система Б) поджелудочная железа В) щитовидная железа

82. ПРИ РАЗРЫВЕ МАТОЧНОЙ ГУБЫ КРОВЬ СКАПЛИВАЕТСЯ:

- А) в дугласовом пространстве Б) в переднем своде влагалища В) во влагалище

83. СИМПТОМЫ ТРУБНОГО АБОРТА:

- А) схваткообразные боли внизу живота Б) внутреннее кровотечение В) метеоризм

84. ПРЕРЫВАНИЕ ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ ЧАЩЕ ПРОИСХОДИТ НА СРОКЕ:

- А) 5-6 недель Б) 2-3 недели В) 10-12 недель

85. СИМПТОМЫ УГРОЖАЮЩЕГО ВЫКИДЫША:

- А) повышение тонуса матки, боли в Животе
Б) изменение сердцебиения плода
В) отсутствие роста матки

86. ЧТО ТАКОЕ ПОЛИМЕНОРЕЯ?

- А) интервал между месячными менее 21 дня
Б) обильные менструации
В) интервал между месячными более 35 дней

87. ПРИБЛИЖИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ШЕЙКИ МАТКИ:

- А) бочкообразной формы Б) в норме В) округлой формы

88. ТРУБНЫЙ АБОРТ ВОЗНИКАЕТ ПРИ ИМПЛАНТАЦИИ ПЛОДНОГО ЯЙЦА, В ЧАСТИ МАТОЧНОЙ ТРУБЫ:

- А) ампулярной Б) интерстициальной: В) истмической

89. ИСКУССТВЕННЫЙ АБОРТ ЭТО ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ НА СРОКЕ ДО:

- А) 12 недель Б) 15 недель В) 10 недель

90. ПРИВЫЧНЫЙ ВЫКИДЫШ - ЭТО АБОРТ:

- А) самопроизвольный два или более раз
Б) по медицинским показаниям
В) на раннем сроке беременности

91. ЛЕЧЕНИЕ СИНДРОМА ШИХАНА ВКЛЮЧАЕТ:

- А) заместительную гормональную терапию Б) химиотерапию В) хирургическое лечение

92. ИЗ КАКОЙ ТКАНИ РАЗВИВАЕТСЯ МИОМА МАТКИ?

- А) мышечная Б) лимфоидная В) эпителиальная

93. ТАКТИКА ВРАЧА ПРИ БЕССИМПТОМНОЙ МИОМЕ МАТКИ У ЖЕНЩИНЫ 36 ЛЕТ, ЕСЛИ РАЗМЕРЫ ОПУХОЛИ ДО 20 НЕДЕЛЬ БЕРЕМЕННОСТИ?

- А) оперативное лечение Б) наблюдение В) гормональная терапия

94. ПРИ ТЯЖЕЛОМ СОСТОЯНИИ БОЛЬНОЙ С ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ ТРУБНОЙ БЕРЕМЕННОСТЬЮ ПОКАЗАНО:

- А) все перечисленное
Б) безотлагательное удаление источника кровотечения (беременной трубы)
В) немедленное переливание крови

95. РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ, ОПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ, ВКЛЮЧАЕТ:

- А) все перечисленное Б) ультразвуковую терапию В) электрофорез лекарственных средств

96. ПОЧЕМУ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮТСЯ ЗАПУЩЕННЫЕ ФОРМЫ РАКА ЯИЧНИКОВ:

- А) позднее обращение больных из-за малосимптомности заболевания
Б) быстрое развитие болезни
В) низкий охват проф. осмотрами

97. ДИСПАЗИЯ ШЕЙКИ МАТКИ - ЭТО:

- А) предрак Б) фоновое заболевание В) воспаление

98. У БОЛЬНОЙ ДИАГНОСТИРОВАННАЯ ПРОГРЕССИРУЮЩАЯ ВНЕМАТОЧНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ. ПОКАЗАНО:

- А) операция
Б) консервативное противовоспалительное лечение
В) гемотрансфузия

99. НА КАКОМ СРОКЕ ВВОДЯТ ВМК?

- А) согласно инструкции Б) на 2 года В) на 1 год

100. НАИБОЛЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОЙ КОНТРАЦЕПЦИЕЙ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ ЯВЛЯЕТСЯ:

- А) КОК + презервативы Б) ВМК В) презервативы