

Партизанский филиал
краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Владивостокский базовый медицинский колледж»

Материалы
для самоподготовки студентов к промежуточной аттестации
специальность 31.02.01. Лечебное дело
3 курс
МДК.02.03. Оказание акушерско-гинекологической помощи: экзамен

Рассмотрено на ПЦК Клинических дисциплин

Протокол № 3 от «12» ноября 2019 г.

Составил: Атюшева Галина Алексеевна

Правильный ответ под «А»

1. СРОКИ ИСТИННОГО ПЕРЕНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ?

- А) 42 и более недели
Б) 37-38 недель
В) 40-41 неделя
Г) 39-40 недель

2. ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДЕКСА СОЛОВЬЕВА ИЗМЕРЯЕТСЯ

- А) окружность запястья
Б) прямой размер малого таза
В) поперечный размер малого таза
Г) окружность таза

3. ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПРИБАВКА ВЕСА БЕРЕМЕННОЙ ПОСЛЕ 30 НЕДЕЛЬ

- А) до 1 кг
Б) до 3 кг
В) 600,0
Г) 500,0

4. ПРИЗНАК КРУПНОГО ПЛОДА

- А) высота дна матки больше 40 см
Б) беременность больше 42 недель
В) многорожавшая беременная
Г) крупный размер головки

5. НА КАКОМ СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ ВЫСОТА ДНА МАТКИ СОСТАВЛЯЕТ 32 СМ

- А) 30 недель
Б) 26 недель
В) 24 недели
Г) 36 недель

6. ПРЕДВЕСТНИКИ РОДОВ

- А) опускается дно матки
Б) отхождение околоплодных вод
В) учащается шевеление плода
Г) беременность достигает до 39-40 недельного срока

7. СОСТОЯНИЕ НОВОРОЖДЕННОГО ОЦЕНИВАЕТСЯ

- А) по шкале Апгар
Б) по шкале Витглингера
В) по Персианинову
Г) по Леопольду

8. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ НОВОРОЖДЕННОГО СОСТАВЛЯЕТ

- А) 1 месяц
Б) 1-2 недели
В) 4-5 дней
Г) 1-2 дня

9. КАК НАЗЫВАЕТСЯ ТРЕТИЙ ПЕРИОД РОДОВ

- А) период рождения последа
Б) через 2 часа после родов
В) рождение плода
Г) натужной период

10. ШЕВЕЛЕНИЕ ПЛОДА У ПЕРВОБЕРЕМЕННЫХ ОЩУЩАЕТСЯ НА СРОКЕ

- А) 20 недель
Б) 16-18 недель
В) 24 недели
Г) 26 недель

11. ШЕВЕЛЕНИЕ ПЛОДА У ПОВТОРОБЕРЕМЕННЫХ ОЩУЩАЕТСЯ НА СРОКЕ

- А) 18 недели
Б) 22 недель
В) 19-20 недель
Г) 24 недели

12. ОПРЕДЕЛИТЕ СРОК РОДОВ ПО НЕДЕЛЕ, ЕСЛИ ПОСЛЕДНЯЯ МЕНСТРУАЦИЯ У ЖЕНЩИНЫ БЫЛА 1 АПРЕЛЯ

- А) 8 января
Б) 8 марта
В) 8 февраля
Г) 18 марта

13. ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД НАЧИНАЕТСЯ

- А) с 22 недель беременности
Б) с 30 недель
В) с 32 недель
Г) с 12 недель

14. СРОК РОДОВ ПО ФОРМУЛЕ НЕГЕЛЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

- А) от первого дня последней менструации отнимается 3 месяца и прибавляется 7 дней
Б) в первый день шевеления плода прибавляется 22 недели
В) от дня последней менструации отнимается 2 месяца и прибавляется 7 дней
Г) в первый день последней менструации прибавляется 9 месяцев

15. К АКУШЕРСКОМУ МЕТОДУ НАРУЖНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОТНОСИТСЯ

- А) метод Leopolda - Leviцкого
Б) метод Жордания
В) метод Негеля
Г) метод Рудакова

16. РАННИЙ НЕОНАТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ДЛИТСЯ

- А) до 1 недели после родов
Б) период рождения плода
В) с 28 недель беременности до рождения плода
Г) с рождения новорожденного до 23 часа 59 минут

17. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ БЕРЕМЕННОСТИ В НОРМЕ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 40 недель
Б) 40-42 недели
В) 36-42 недели
Г) 32-40 недели

18. ФОРМА ШЕЙКИ МАТКИ У НЕРОЖАВШИХ ЖЕНЩИН

- А) конусовидная
Б) у всех женщин конусовидная
В) округлой формы
Г) цилиндрическая

19. ГИПОТАЛАМУС ВЫРАБАТЫВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ГОРМОНЫ

- А) рилизинг-факторы
Б) гонадотропины
В) гестогены
Г) эстрогены

20. ФСГ СТИМУЛИРУЕТ

- А) рост фолликулов в яичнике
Б) продукцию кортикостероидов
В) все перечисленное
Г) продукцию ТТГ в щитовидной железе

21. ДОСТОВЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) выслушивание сердцебиения плода
Б) пигментация кожных покровов
В) отсутствие менструации
Г) увеличение плода

22. УКАЖИТЕ ПРЕДЛЕЖАЩУЮ ЧАСТЬ ПРИ ЧАСТИЧНОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ ПЛАЦЕНТЫ

- А) рядом с плодным пузырем плацентарная ткань
Б) мясистая ткань
В) плодный пузырь
Г) головка

23. НОРМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД ПРИ ДОНОШЕННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ.

- А) 0,5 - 1,5 литра
Б) 5-6 литров
В) более 6 литров
Г) 3-4 литра

24. К ОСНОВНОМУ ПРИЗНАКУ АНТОМИЧЕСКОГО УЗКОГО ТАЗА ОТНОСИТСЯ

- А) уменьшенный размер наружной конъюгаты
Б) маленький размер индекса Соловьева
В) крупное телосложение
Г) рост беременной 150 см

25. СЕРДЦЕБИЕНИЕ ПЛОДА ПРИ 1 ПОЗИЦИИ ВЫСЛУШИВАЕТСЯ

- А) слева от пупка
Б) над лоном
В) справа от пупка
Г) выше пупка

26. ДИСТАНЦИЯ СПИНАРУМ РАВНА

- А) 25-26 см
Б) 28-29 см
В) 30-31 см
Г) 20-21 см

27. ДИСТАНЦИЯ ТРОХАНТЕРИКА РАВНА

- А) 30-31 см
Б) 20-21 см
В) 25-26 см
Г) 28-29 см

28. РАЗМЕР НАРУЖНОЙ КОНЪЮГАТЫ

- А) 20-21 см
Б) 28-29 см
В) 30-31 см
Г) 25-26 см

29. В СОСТАВ ПОСЛЕДА ВХОДИТ

- А) плацента, пуповина и оболочки плода
Б) плаценты и оболочки
В) плацента и пуповина
Г) плацента

30. СИМПТОМЫ ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ КЛИНИЧЕСКИ УЗКОГО ТАЗА

- А) правильно выраженная конфигурация головки, продолжительные роды
- Б) нарушается сердцебиение плода
- В) симптом Вастена "вровень"
- Г) внутриутробная гипоксия плода

31. ГРАВИ-ТЕСТ ОСНОВАН НА

- А) определение хорионгонадотропина в моче
- Б) определение скрытых отеков
- В) определение срока овуляции
- Г) определение экскрадиола в моче

32. ФСГ ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ В

- А) передней доле гипофиза
- Б) плаценте
- В) яичниках
- Г) гипоталамусе

33. ЗА РАЗВИТИЕ Фолликулов в яичниках ответственные гормоны

- А) ФСГ
- Б) рилизинг фактор ФСГ
- В) эстрогены
- Г) пролактин

34. МЕСТО ВЫСЛУШИВАНИЕ СЕРДЦЕБИЕНИЯ ПЛОДА ПРИ 2 ПОЗИЦИИ

- А) справа от пупка
- Б) выше пупка
- В) над лоном
- Г) слева от пупка

35. ПОЛОЖЕНИЕ ПЛОДА — ЭТО

- А) отношение оси плода к длиннику матки
- Б) отношение спинки плода к фронтальной плоскости
- В) отношение оси плода к поперечнику матки
- Г) отношение спинки плода к сагиттальной плоскости

36. ПРАВИЛЬНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ПЛОДА СЧИТАЕТСЯ

- А) продольное
- Б) косое
- В) поперечное с головкой плода, обращенной вправо
- Г) поперечное с головкой плода, обращенной влево

37. ПОЗИЦИЯ ПЛОДА ПРИ ПОПЕРЕЧНОМ ПОЛОЖЕНИИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО РАСПОЛОЖЕНИЮ

- А) головки
- Б) мелких частей
- В) тазового конца
- Г) спинки

38. ПРЕДЛЕЖАНИЕ ПЛОДА - ЭТО ОТНОШЕНИЕ

- А) крупной части плода ко входу в малый таз
- Б) головки плода ко входу в таз
- В) головки плода ко дну матки
- Г) тазового конца плода ко входу в малый таз

39. ПЕРВЫМ ПРИЕМОМ НАРУЖНОГО АКУШЕРСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

- А) высота стояния дна матки
- Б) предлежащая часть
- В) вид плода
- Г) позиция плода

40. ОКРУЖНОСТЬ ЖИВОТА ИЗМЕРЯЕТСЯ НА

- А) уровне пупка
- Б) середине расстояния между пупком и мечевидным отростком
- В) 3 поперечных пальца ниже пупка
- Г) середине расстояния между пупком и лонным сочленением

41. ИСТИННАЯ КОНЪЮГАТА ЭТО РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ

- А) наиболее выступающими внутрь точками симфиза и мысом
- Б) нижним краем симфиза и выступающей точкой мыса
- В) верхним краем симфиза
- Г) серединой верхнего края лонного сочленения и мысом

42. ДОСТОВЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) сердцебиение плода
- Б) диспепсические нарушения
- В) отсутствие менструаций
- Г) увеличение размеров матки

43. ДЛЯ ТАЗОВОГО ПРЕДЛЕЖАЮЩА ПРИБН АРУЖНОМ АКУШЕРСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ НЕ ХАРАКТЕРНО

- А) баллотирующая часть над входом в малый таз
- Б) низкое расположение дна матки

- В) баллотирующая часть в две матки
- Г) высокое расположение дна матки

44. КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕЛОЙ ОСТРОЙ ГИПОКСИИ ПЛОДА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) аритмия
- Б) глухость тонов сердца плода

- В) сердцебиение плода 120-140 уд/мин
- Г) сердцебиение плода 100-110 уд/мин

45. ТЯЖЕСТЬ ТОКСИКОЗА 1-Й ПОЛОВИНЫ БЕРЕМЕННОСТИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- А) ацетонурией
- Б) гипертензией

- В) диареей
- Г) увеличением массы тела

46. ПРИ ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ НОВОРОЖДЕННОГО НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ

- А) состояние зрачков
- Б) сердцебиение

- В) мышечный тонус
- Г) дыхание

47. ПРИ ДЛИТЕЛЬНОСТИ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА 28 ДНЕЙ ЕГО СЛЕДУЕТ СЧИТАТЬ

- А) нормопонирующим
- Б) антепонирующим

- В) гипопонирующим
- Г) постпонирующим

48. ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ПОЗДНЕГО ГЕСТОЗА БЕРЕМЕННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) гипертоническая болезнь
- Б) возраст первородящей 25 лет

- В) поперечное положение плода
- Г) вторая беременность

49. ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ РАННИХ СРОКОВ БЕРЕМЕННОСТИ НАИБОЛЕЕ ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ

- А) оценка вероятных признаков беременности
- Б) интерпретация данных влагалищного исследования
- В) проведение иммунологических тестов на беременность
- Г) оценка сомнительных признаков беременности

50. НАЛИЧИЕ АКТИВНОГО РЕВМАТИЗМА ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ

- А) ухудшает протекание ее течения
- Б) не влияет на ее исход

- В) облегчает ее течение
- Г) не является фактором риска гестоза

51. ПРЕЭКЛАМПСИЮ ОТЛИЧАЕТ ОТ ПРОГРЕССИРУЮЩЕГО ГЕСТОЗА БЕРЕМЕННЫХ

- А) появление общемозговых симптомов
- Б) уровень артериального давления

- В) олигурия
- Г) выраженность отекающего синдрома

52. ОСТРАЯ ПЛАЦЕНТАРНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ВОЗНИКАЕТ В СЛЕДСТВИЕ

- А) отслойки плаценты
- Б) наличия гестоза

- В) узкого таза
- Г) многоводия

53. ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА РАЗВИТИЯ ПРЕДЛЕЖАНИЯ ПЛАЦЕНТЫ

- А) дистрофические изменения слизистой оболочки матки
- Б) многоводие

- В) многоплодие
- Г) неправильное положение плода

54. ДЛЯ КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ ПРЕДЛЕЖАНИИ ПЛАЦЕНТЫ ХАРАКТЕРНО

- А) волнообразность, алая кровь, безболезненность, беспричинность
- Б) темный цвет крови
- В) болезненность
- Г) массивность, длительность

55. КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИ ПРЕДЛЕЖАНИИ ПЛАЦЕНТЫ

- А) матка мягкая, симметричная, кровь алая
- Б) матка в тонусе, болезненная, асимметричная

- В) матка мягкая, сердцебиение плода отсутствует
- Г) матка в тонусе, массивное длительное кровотечение

56. ВЫБОР АКУШЕРСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ПРЕДЛЕЖАНИИ ПЛАЦЕНТЫ ЗАВИСИТ ОТ

- А) вида предлежания
- Б) степени раскрытия шейки матки

- В) общего состояния роженицы
- Г) состояния плода

57. НАИБОЛЕЕ ЧАСТАЯ ПРИЧИНА РАЗВИТИЯ ПРИРАЩЕНИЯ ПЛАЦЕНТЫ

- А) наличие перенесенных абортов
- В) пиелонефрит
- Б) отсутствие абортов в анамнезе
- Г) пузырьный занос

58. ОПТИМАЛЬНЫЙ СРОК БЕРЕМЕННОСТИ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ЖЕНЩИНЫ НА УЧЕТ В ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ

- А) до 12 недель беременности
- В) до 14 недель беременности
- Б) до 13 недель беременности
- Г) при любом сроке беременности

59. В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ БЕРЕМЕННОСТИ БЕРЕМЕННАЯ ДОЛЖНА ПОСЕЩАТЬ ЖЕНСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

- А) 1 раз в месяц
- В) по желанию
- Б) 2 раза в месяц
- Г) 1 раз в неделю

60. ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ БЕРЕМЕННОСТИ БЕРЕМЕННАЯ ДОЛЖНА ПОСЕЩАТЬ ЖЕНСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

- А) 1 раз в 2 недели
- В) по желанию
- Б) 1 раз в 10 дней
- Г) 1 раз в месяц

61. ПРИ НАБЛЮДЕНИИ В ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ КАЖДАЯ БЕРЕМЕННАЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНА БЫТЬ ОСМОТРЕНА

- А) терапевтом и стоматологом, при наличии показаний - другими специалистами
- Б) стоматологом, ЛОР-специалистом, при наличии показаний - другими специалистами
- В) терапевтом, хирургом, стоматологом, ЛОР-специалистом
- Г) терапевтом, гематологом, стоматологом, дерматологом

62. ЗДОРОВАЯ БЕРЕМЕННАЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ОСМОТРЕНА ТЕРАПЕВТОМ

- А) 2 раза за беременность
- В) 1 раз за беременность
- Б) по показаниям
- Г) ежемесячно

63. ПРИ 12-ТИ НЕДЕЛЬНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ ДНО МАТКИ НАХОДИТСЯ

- А) на уровне лобка
- В) за пределами малого таза
- Б) на 2 см выше лона
- Г) на уровне пупка

64. ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ БЕРЕМЕННОСТИ ПРЕИМУЩЕСТВО ИМЕЮТ ПРИЗНАКИ

- А) достоверные
- В) ранние
- Б) сомнительные
- Г) вероятные

65. ДОСТОВЕРНЫЙ ПРИЗНАК БЕРЕМЕННОСТИ

- А) выслушивание сердцебиения плода
- В) рвота, тошнота
- Б) увеличение молочных желез
- Г) увеличение матки

66. ВЕРОЯТНЫЙ ПРИЗНАК БЕРЕМЕННОСТИ

- А) прекращение менструации
- В) тошнота
- Б) выслушивание сердцебиения плода
- Г) пигментация кожи

67. ЭКСПРЕСС АНАЛИЗ НА БЕРЕМЕННОСТЬ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ОПРЕДЕЛЕНИИ

- А) хорионического гонадотропина
- В) эстрогенных гормонов
- Б) прогестерона
- Г) гормонов гипофиза

68. ПРИЗНАК ТАЗОВОГО ПРЕДЛЕЖАНИЯ ПЛОДА

- А) головка плода у дна матки
- В) высокое стояние головки
- Б) раннее излитие вод
- Г) сердцебиение плода у дна матки

69. САМОЙ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ КРОВОТЕЧЕНИЯ В I ПОЛОВИНЕ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) самопроизвольный выкидыш
- Б) преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты
- В) пузырьный занос
- Г) рак шейки матки

70. МНОГОПЛОДИЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРИ

- А) наружных приемах акушерского исследования
- Б) влагалищном исследовании

- В) рентгенологическом исследовании
- Г) иммунологической реакции

71. ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ В РАННИЕ СРОКИ СООТВЕТСТВУЕТ СРОКУ БЕРЕМЕННОСТИ

- А) 4 - 12 недель
- Б) 18 - 23 недель
- В) 13 - 17 недель
- Г) 24 - 26 недель

72. ОПРЕДЕЛЕНИЕ «ПОЗДНИЙ АБОРТ» СООТВЕТСТВУЕТ СРОКУ БЕРЕМЕННОСТИ

- А) 13 - 17 недель
- Б) 31 - 33 недель
- В) 34 - 36 недель
- Г) 28 - 30 недель

73. ОПРЕДЕЛЕНИЕ «ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ» СООТВЕТСТВУЕТ СРОКУ БЕРЕМЕННОСТИ

- А) 28 недель
- Б) 21 недель
- В) 39 недель
- Г) 20 недель

74. ПРИВЫЧНЫЙ АБОРТ - ЭТО

- А) самопроизвольное прерывание беременности более 2-х раз
- Б) прерывание беременности более 3-х раз
- В) прерывание беременности более 4-х раз
- Г) прерывание беременности более 5-х раз

75. РАННИЙ СРОК БЕРЕМЕННОСТИ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ ПО

- А) уровню хориального гонадотропина в утренней моче
- Б) величине матки
- В) жалобам пациентки
- Г) базальной температуре

76. ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЛОДА, ВОЗНИКШИЕ ПОСЛЕ 12 НЕДЕЛЬ БЕРЕМЕННОСТИ, НАЗЫВАЮТ

- А) фетопатия
- Б) зиготопатия
- В) бластопатия
- Г) эмбриопатия

77. ПОД ВЛИЯНИЕМ ПОВРЕЖДАЮЩЕГО ФАКТОРА БЛАСТОПАТИЯ ВОЗНИКАЕТ

- А) в первые 15 дней с момента оплодотворения
- Б) с начала 8-го лунного месяца до родов
- В) с 71 дня до конца 7-го лунного месяца
- Г) с 16 по 70 день с момента оплодотворения

78. ПОЛНОЕ ПРЕДЛЕЖАНИЕ ПЛАЦЕНТЫ ДИАГНОСТИРУЕТСЯ ПРИ

- А) открытии маточного зева на 4 см и более
- Б) открытии маточного зева менее 4 см
- В) закрытом маточном зеве
- Г) полном открытии

79. В ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ОСМОТР ПРИ ПОМОЩИ ЗЕРКАЛ У ЗДОРОВОЙ БЕРЕМЕННОЙ ПРОВОДЯТ

- А) однократно при взятии на учет
- Б) при направлении в родильный дом
- В) 2 раза за беременность
- Г) 3 раза за беременность

80. ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТИ

- А) инфекционный агент
- Б) генетический фактор
- В) социально-биологический фактор
- Г) гиперандрогенный фактор

81. БЕРЕМЕННЫЕ С МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТЬЮ

- А) госпитализируются на роды в 37-38 недель
- Б) наблюдаются пассивно
- В) госпитализируются на роды в 39-40 недель
- Г) дополнительно обследуются генетиком

82. ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ ПЛОДА В I ПОЗИЦИИ ПАЦИЕНТКУ УКЛАДЫВАЮТ

- А) на правый бок
- Б) на живот
- В) спину
- Г) на левый бок

83. В ПЛАН ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОЙ С ГАЗОВЫМ ПРЕДЛЕЖАНИЕМ ПЛОДА В ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ВКЛЮЧАЕТ

- А) комплекс корригирующих мероприятий в 29-34 недель
- Б) наружный акушерский поворот
- В) пассивное наблюдение
- Г) госпитализацию в родильный дом в 40 недель

84. ДЛЯ СОЧЕТАННЫХ ФОРМ ПОЗДНЕГО ГЕСТОЗА ХАРАКТЕРНО

- А) раннее начало
- В) преобладание симптомов экстрагенитального заболевания
- Б) изменение гемодинамических показателей
- Г) нарушение маточно-плацентарного кровотока

85. БЕРЕМЕННОЙ ИЗ «ГРУППЫ ВЫСОКОГО РИСКА» НЕОБХОДИМО

- А) обследование в стационаре
- В) дополнительное обследование терапевтом
- Б) дополнительное обследование генетиком
- Г) прерывание беременности

86. РАННИМ КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМОМ ПОЗДНЕГО ГЕСТОЗА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) снижение диуреза
- В) повышение диастолического давления
- Б) тошнота
- Г) анурия

87. СОЧЕТАННАЯ ФОРМА ПОЗДНЕГО ГЕСТОЗА РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ

- А) 20-26 недель
- В) 27-32 недель
- Б) 37-39 недель
- Г) 33-36 недель

88. ХАРАКТЕРНЫЙ ПРИЗНАК ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ ОТСЛОЙКИ НОРМАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ

- А) локальная болезненность матки, гипертонус матки
- В) нормальный тонус матки
- Б) боли в крестце и поясничной области
- Г) кровянистые выделения

89. В ОСНОВЕ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ПОЗДНЕГО ГЕСТОЗА ЛЕЖИТ

- А) длительность течения
- В) раннее начало
- Б) плацентарная недостаточность
- Г) возраст женщины

90. ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ ГЕСТОЗА ЛЕГКОЙ И СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) гипертензия
- В) боль в эпигастральной области
- Б) головная боль
- Г) нарушение зрения

91. ОСЛОЖНЕНИЕМ НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) ДВС-синдром
- В) эндометрит
- Б) сепсис
- Г) разрывы шейки матки

92. ДЛЯ ПРЕГЕСТОЗА ХАРАКТЕРНА

- А) патологическая и неравномерная прибавка масса тела
- Б) тошнота
- В) лабильность и асимметрия АД
- Г) задержка внутриутробного развития плода

93. ПРИЧИНОЙ НЕВЫНАШИВАНИЯ В I ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЮТСЯ

- А) гормональные нарушения
- В) хромосомные аномалии
- Б) иммунологические факторы
- Г) патологии яйцеклетки

94. РАЗМЕРЫ МАТКИ БОЛЬШЕ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО СРОКА БЕРЕМЕННОСТИ МОГУТ НАБЛЮДАТЬСЯ ПРИ

- А) пузырном заносе
- В) миоме матки
- Б) двурогой матке
- Г) седловиной матке

95. ПРИЧИНА РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

- А) расход железа на фетоплацентарный комплекс
- В) хроническая незначительная кровопотеря
- Б) нарушение всасывания железа в ЖКТ
- Г) хронический пиелонефрит

96. ПРИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ СНИЖАЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО ЖЕЛЕЗА В

- А) крови
- В) печени
- Б) селезенке
- Г) костном мозге

97. ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА НЕВЫНАШИВАНИЯ ВО II ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ

- А) истмико-цервикальная недостаточность
- В) инфекционные заболевания
- Б) вредные привычки
- Г) гормональная недостаточность яичников и плаценты

98. ХАРАКТЕРНЫЙ СИМПТОМ, ВОЗНИКАЮЩИЙ ПРИ ОТСЛОЙКЕ НОРМАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ

- А) гипоксия плода
- В) изменение консистенции и конфигурации матки
- Б) головная боль
- Г) внутриутробная гибель плода

99. В ПУПОВИНЕ ПЛОДА РАСПОЛОЖЕНЫ СОСУДЫ

- А) две артерии, одна вена
- В) две вены, одна артерия
- Б) три вены
- Г) три артерии

100. НАРУЖНОЕ АКУШЕРСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОВОДИТСЯ В ПОЛОЖЕНИИ ЖЕНЩИНЫ

- А) лежа на кушетке
- В) полулежа на кушетке
- Б) полусидя на кресле
- Г) лежа на кресле

101. ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ГЕМОДИНАМИКИ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

- А) увеличение объема циркулирующей крови
- Б) уменьшение количества эритроцитов и гемоглобина
- В) снижения объема циркулирующей крови
- Г) снижение АД

102. ОСНОВНЫМ СИМПТОМОМ ПРИ ЗАДЕРЖКЕ В МАТКЕ ДЕТСКОГО МЕСТА ИЛИ ЕГО ЧАСТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) кровотечение из половых путей
- Б) резкая боль в надлобковой области
- В) отсутствие наружного кровотечения
- Г) уменьшение матки в объеме

103. ПАЦИЕНТКУ СЛЕДУЕТ ПРЕДУПРЕДИТЬ О ТОМ, ЧТО НА РАННИХ СРОКАХ БЕРЕМЕННОСТИ ВЫЗВАТЬ АНМАЛИИ ПЛОДА МОЖЕТ

- А) краснуха
- Б) пневмония
- В) туберкулез
- Г) ветряная оспа

104. В ОБЪЕМ ДОГОСПИТАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ПРИ ЭКЛАМПСИЧЕСКОМ СТАТУСЕ НЕ ВХОДИТ

- А) проведение дегидратационной терапии лазиксом
- Б) внутривенное введение магния сульфата, дроперидола, спазмолитиков
- В) интубация трахеи и проведение искусственной вентиляции легких
- Г) внутривенное введение противосудорожных препаратов

105. ОБЪЕМ ДОГОСПИТАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ПРИ НАРУШЕННОЙ ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ ВКЛЮЧАЕТ

- А) экстренную госпитализацию в гинекологическое отделение стационара на фоне поддерживающей инфузионной терапии
- Б) обезболивание, госпитализацию в гинекологическое отделение стационара на фоне поддерживающей инфузионной терапии
- В) введение средств сокращающих матку – окситоцин, госпитализацию в гинекологическое отделение стационара на фоне поддерживающей инфузионной терапии
- Г) экстренную госпитализацию в гинекологическое отделение стационара без дополнительных лечебных мероприятий

106. ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ ОТСЛОЙКА НОРМАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМ

- А) тонус матки повышен, асимметрия матки
- Б) кожные покровы розовые
- В) сердцебиение плода хорошо прослушивается
- Г) кровотечение отсутствует

107. ДЛЯ ЭКЛАМПСИИ ХАРАКТЕРНО

- А) наличие тонических и клонических судорог
- Б) отсутствие судорожного синдрома
- В) запах ацетона изо рта
- Г) высокая температура

108. ПОКАЗАТЕЛИ ТЯЖЕСТИ ЭКЛАМПСИИ ЯВЛЯЮТСЯ

- А) количество припадков, их длительность, продолжительность бессознательного состояния
- Б) выраженный отечный синдром, гипертензия
- В) протеинурия, выраженный болевой синдром
- Г) выраженный болевой синдром, количество припадков, гипертензия

109. ДЛЯ СПОНТАННОГО ВЫКИДЫША ХАРАКТЕРНО

- А) кровянистые выделения, повышения тонуса матки, боли в нижних отделах живота
- Б) повышение тонуса матки, учащение пульса, озноб
- В) повышение тонуса матки, тошнота, рвота
- Г) повышение температуры, схваткообразные боли в животе

110. ТЯЖЕЛУЮ ПРЕЭКЛАМПСИЮ БЕРЕМЕННЫХ ОТЛИЧАЮТ ОТ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ

- А) появление общемозговых симптомов
- Б) уровень АД
- В) олигурия
- Г) выраженность отечного синдрома

111. ПРИ ПРЕДЛЕЖАНИИ ПЛАЦЕНТЫ ОБИЛЬНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ ЧАЩЕ БЫВАЕТ

- А) во время родов
- Б) до родов
- В) после родов
- Г) в после родовый период

112. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННУЮ ОТСЛОЙКУ НОРМАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ НЕОБХОДИМО

- А) незамедлительно доставить беременную в ближайшей акушерский стационар
- Б) рекомендовать беременной обратиться в женскую консультацию
- В) вызвать на себя акушерскую бригаду
- Г) немедленно транспортировать роженицу в ближайшее лечебное учреждение

113. ЧИСЛО ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ В НОРМЕ У ВЗРОСЛОГО В 1 МИНУТУ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 16-18
- Б) 20-22
- В) 22-25
- Г) 18-20

114. ЧИСЛО СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ В НОРМЕ У ВЗРОСЛОГО В 1 МИНУТУ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 60-80
- Б) 60-90
- В) 80-100
- Г) 60-100

115. АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ У ВЗРОСЛОГО В НОРМЕ СОСТАВЛЯЕТ (ММ РТ.СТ)

- А) 120/80
- Б) 160/90
- В) 90/60
- Г) 140/100

116.НОРМАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЯ ДНЕВНОГО И НОЧНОГО ДИУРЕЗА

- А)3:1
Б)1:1
В)2:1
Г)1:2

117.ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ МОЧИ В ОБЩЕМ АНАЛИЗЕ СОСТАВЛЯЕТ

- А)1015-1025
Б)1002-1015
В)1015-1030
Г)1030-1040

118.КОЛИЧЕСТВО ЭРИТРОЦИТОВ В АНАЛИЗЕ МОЧИ ПО НЕЧЕПАРЕНКО В 1МЛ ДО

- А)1000
Б)2000
В)1500
Г)2500

119.КОЛИЧЕСТВО ЛЕЙКОЦИТОВ В АНАЛИЗЕ МОЧИ ПО НЕЧМПАРЕНКО В 1МЛ ДО

- А)2000
Б)2500
В)3000
Г)2300

120.КОЛИЧЕСТВО ЭРИТРОЦИТОВ В ОБЩЕМ АНАЛИЗЕ МОЧИ(В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ)

- А)0-2
Б)6-8
В)3-5
Г)9-11

121.КОЛИЧЕСТВО ЭРИТРОЦИТОВ В ОБЩЕМ АНАЛИЗЕ КРОВИ В НОРМЕ У МУЖЧИН(*10¹²/Л)

- А)4,5-5,0
Б)6,0-8,0
В)8,0-9,0
Г)4,5-6,0

122.КОЛИЧЕСТВО ГЕМОГЛАБИНА В НОРМЕ У ЖЕНЩИН СОСТАВЛЯЕТ (Г/Л)

- А)120-140
Б)120-160
В)140-180
Г)140-160

123. ЗНАЧЕНИЕ СОЭ В НОРМЕ У МУЖЧИН (ММ/Ч)

- А)2-10
Б)2-29
В)2-18
Г)2-15

124.КОЛИЧЕСТВО ГЕМОГЛАБИНА В НОРМЕ У МУЖЧИН СОСТАВЛЯЕТ (Г/Л)

- А)130-160
Б)130-180
В)120-140
Г)120-160

125.КОЛИЧЕСТВО ЛЕЙКОЦИТОВ В ОБЩЕМ АНАЛИЗЕ КРОВИ В НОРМЕ (*10⁹В 1Л)

- А)4-9
Б)6-9
В)4-1
Г)4-7

126.КОЛИЧЕСТВО ТРОМБОЦИТОВ В ОБЩЕМ АНАЛИЗЕ МОЧИ В НОРМЕ (*10⁹В 1Л)

- А)180-320
Б)120-320
В)180-240
Г)120-240

127. СОДЕРЖАНИЕ СЕГМЕНТОЯДЕРНЫХ НЕЙТРОФИЛОВ В ЛЕЙКОГРАММЕ В НОРМЕ(%)

- А)47-72
Б) 0-10
В)20-40
Г) 6-8

128. СОДЕРЖАНИЕ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ НАТОЩАК В НОРМЕ(ММОЛЬ/Л)

- А)3,3-5,5
Б) 1,1-2,2
В)6,6-8,8
Г)8,8-9,9

129.ЗНАЧЕНИЕ СОЭ В НОРМЕ У ЖЕНЩИН(ММ/ч)

- А)2-15
- Б)2-6
- В)2-8
- Г)2-10

130.ЖЕНЩИНАМ В СЛУЧАЕ НАСТУПЛЕНИЯ РОДОВ С 22 НЕДЕЛЬ ДО 30 НЕДЕЛЬ БЕРЕМЕННОСТИ И РОЖДЕНИЯ ЖИВОГО РЕБЕНКА ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ДАЕТСЯ НА СРОК(ДНЕЙ)

- А)156
- Б)86
- В)180
- Г)140

131.ПРИ ОСЛОЖНЕННЫХ РОДАХ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ

- А)выдается дополнительно на 16 календарных дней
- Б) продлевается на 30 дней
- В) продлевается на 10 дней
- Г)не выдается

132.ПРИ ОПЕРАЦИИ ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

- А)выдается на весь период нетрудоспособности, но на срок не менее 3 дней
- Б)не выдается
- В)выдается по решению врачебной комиссии
- Г)выдается по решению медико –социальной экспертизы

133.СРОКИ ИСТИННОГО ПЕРЕНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ(НЕДЕЛЬ)

- А)42 И БОЛЕЕ
- Б)37-38
- В)40-41
- Г)39-40

134.ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ИНДЕКСА СОЛОВЬЕВА ИЗМЕРЯЕТСЯ

- А)окружность запястья
- Б) прямой размер малого таза
- В)поперечный размер малого таза
- Г) окружность таза

135.ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПРИБАВКА ВЕСА БЕРЕМЕННОЙ ПОСЛЕ 30 НЕДЕЛЬ

- А)до 1 кг
- Б) до 3 кг
- В) 600,0
- Г)500,0

136.ПРИЗНАК КРУПНОГО ПЛОДА

- А)высота дна матки больше 40см
- Б) беременность больше 42 недель
- В) многорожавшая беременная
- Г) крупный размер головки

137. НА КАКОМ СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ ВЫСОТА ДНА МАТКИ СОСТАВЛЯЕТ 32СМ

- А)30 недель
- Б)26недель
- В)24недели
- Г)36недель

138.ПРЕДВЕСТНИКИ РОДОВ

- А) опускается дно матки
- Б) отхождения околоплодных вод
- В) учащаются шевеления плода
- Г) беременность достигает до 39-40 недель

139.СОСТОЯНИЕ НОВОРОЖДЕННОГО ОЦЕНИВАЕТСЯ

- А) по шкале Апгар
- Б) по шкале Виттлингера
- В) по Персианинову
- Г) по Леопольду

140.ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ НОВОРОЖДЕННОГО

- А) 1 месяц
- Б) 1-2 недели
- В) 4-5 дней
- Г) 1-2 дня

141.КАК НАЗЫВАЕТСЯ ТРЕТИЙ ПЕРИОД РОДОВ

- А) период рождения последа
- Б) через 2 часа после родов
- В) рождение плода
- Г) потужной период

142.ШЕВЕЛЕНИЕ ПЛОДА У ПЕРВОБЕРЕМЕННЫХ ОЩУЩАЕТСЯ НА СРОКЕ (НЕДЕЛЬ)

- А) 20
- Б) 16-18
- В) 24
- Г) 26

143.ШЕВЕЛЕНИЕ ПЛОДА У ПОВТОРНОБЕРЕМЕННЫХ ОЩУЩАЕТСЯ НА СРОКЕ(НЕДЕЛЬ)

- А) 18
- Б) 22
- В) 19-20
- Г) 24

144. ОПРЕДЕЛИТЕ СРОК РОДОВ ПО НЕГЕЛЕ , ЕСЛИ ПОСЛЕДНЯЯ МЕНСТРУАЦИЯ БЫЛА 1 АПРЕЛЯ

- А) 8 января
- Б) 8 марта
- В) 8 февраля
- Г) 18 марта

145.ПЕРИНОТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД НАЧИНАЕТСЯ

- А) с 22 недель беременности
- Б) с 30 недель
- В) с 32 недель
- Г) с 12 недель

146.СРОК РОДОВ ПО ФОРМУЛЕ НЕГЕЛЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

- А) от первого дня последней менструации отнимается 3 месяца и прибавляется 7 дней
- Б) в первый день шевеления плода прибавляется 22 недели
- В) от дня последней менструации отнимается 2 месяца и прибавляется 7 дней
- Г) в первый день последней менструации прибавляется 9 месяцев

147.К АКУШЕРСКОМУ МЕТОДУ НАРУЖНОГО ИСЛЕДОВАНИЯ ОТНОСИТСЯ

- А) метод Леопольда –Левицкого
- Б) метод Жордания
- В) метод Негеля
- Г) метод Рудакова

148.РАННИЙ НЕОНАТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ДЛИТСЯ

- А) идо 1 недели после родов
- Б) период рождения плода
- В) с 28 недель до рождения плода
- Г) с рождения до 23 часов 59 минут

149.ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ БЕРЕМЕННОСТИ В НОРМЕ СОСТАВЛЯЕТ(НЕДЕЛЬ)

- А) 40
- Б)40-42
- В)36-42
- Г)32-49

150.ФОРМА ШЕЙКИ МАТКИ У НЕРОЖАВШИХ ЖЕНЩИН

- А) конусовидная
- Б) у всех женщин конусовидная
- В) округлой формы
- Г) цилиндрическая

151. СРОКИ ИСТИННОГО ПЕРЕНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ(НЕДЕЛЬ)

- А)42 И БОЛЕЕ
- Б)37-38
- В)40-41
- Г)39-40

152.ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ИНДЕКСА СОЛОВЬЕВА ИЗМЕРЯЕТСЯ

- А)окружность запястья
- Б) прямой размер малого таза
- В)поперечный размер малого таза
- Г) окружность таза

153.ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПРИБАВКА ВЕСА БЕРЕМЕННОЙ ПОСЛЕ 30 НЕДЕЛЬ

- А)до 1 кг
- Б) до 3 кг
- В) 600,0
- Г)500,0

154.ПРИЗНАК КРУПНОГО ПЛОДА

- А)высота дна матки больше 40см
- Б) беременность больше 42 недель
- В) многорожавшая беременная
- Г) крупный размер головки

155. НА КАКОМ СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ ВЫСОТА ДНА МАТКИ СОСТАВЛЯЕТ 32СМ

- А)30 недель
- Б)26недель
- В)24недели
- Г)36недель

156.ПРЕДВЕСТНИКИ РОДОВ

- А)опускается дно матки
- Б) отхождения околоплодных вод
- В) учащаются шевеления плода
- Г)беременность достигает до 39-40 недель

157. СОСТОЯНИЕ НОВОРОЖДЕННОГО ОЦЕНИВАЕТСЯ

- А) по шкале Апгар
- Б) по шкале Виттлингера
- В) по Персианинову
- Г) по Леопольду

158. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ НОВОРОЖДЕННОГО

- А) 1 месяц
- Б) 1-2 недели
- В) 4-5 дней
- Г) 1-2 дня

159. КАК НАЗЫВАЕТСЯ ТРЕТИЙ ПЕРИОД РОДОВ

- А) период рождения последа
- Б) через 2 часа после родов
- В) рождение плода
- Г) потужной период

160. ШЕВЕЛЕНИЕ ПЛОДА У ПЕРВОБЕРЕМЕННЫХ ОЩУЩАЕТСЯ НА СРОКЕ (НЕДЕЛЬ)

- А) 20
- Б) 16-18
- В) 24
- Г) 26

161. ШЕВЕЛЕНИЕ ПЛОДА У ПОВТОРНОБЕРЕМЕННЫХ ОЩУЩАЕТСЯ НА СРОКЕ (НЕДЕЛЬ)

- А) 18
- Б) 22
- В) 19-20
- Г) 24

162. ОПРЕДЕЛИТЕ СРОК РОДОВ ПО НЕГЕЛЕ, ЕСЛИ ПОСЛЕДНЯЯ МЕНСТРУАЦИЯ БЫЛА 1 АПРЕЛЯ

- А) 8 января
- Б) 8 марта
- В) 8 февраля
- Г) 18 марта

163. ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД НАЧИНАЕТСЯ

- А) с 22 недель беременности
- Б) с 30 недель
- В) с 32 недель
- Г) с 12 недель

164. СРОК РОДОВ ПО ФОРМУЛЕ НЕГЕЛЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

- А) от первого дня последней менструации отнимается 3 месяца и прибавляется 7 дней
- Б) в первый день шевеления плода прибавляется 22 недели
- В) от дня последней менструации отнимается 2 месяца и прибавляется 7 дней
- Г) в первый день последней менструации прибавляется 9 месяцев

165. К АКУШЕРСКОМУ МЕТОДУ НАРУЖНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОТНОСИТСЯ

- А) метод Леопольда – Левицкого
- Б) метод Жордания
- В) метод Негеля
- Г) метод Рудакова

166.РАННИЙ НЕОНАТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ДЛИТСЯ

- А) идо 1 недели после родов
- Б) период рождения плода
- В) с 28 недель до рождения плода
- Г) с рождения до 23 часов 59 минут

167.ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ БЕРЕМЕННОСТИ В НОРМЕ СОСТАВЛЯЕТ(НЕДЕЛЬ)

- А) 40
- Б)40-42
- В)36-42
- Г)32-49

168.ФОРМА ШЕЙКИ МАТКИ У НЕРОЖАВШИХ ЖЕНЩИН

- А) конусовидная
- Б) у всех женщин конусовидная
- В) округлой формы
- Г) цилиндрическая

169. ГИПОТАЛАМУС ВЫРОБАТЫВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ГОРМОНЫ

- А)рилизинг –факторы
- Б) гонадотропины
- В) гестогены
- Г) эстрогены

170.ФСГ СТИМУЛИРУЕТ

- А)рост фолликулов в яичнике
- Б)продукцию квртикостероидов
- В) все перечисленные
- Г)продукцию ТТГ в щитовидной железе

171. ДОСТОВЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) выслушивание сердцебиение плода
- Б) пигментация кожных покровов
- В) отсутствие менструации
- Г) увеличение плода

172. УКАЖИТЕ ПРЕДЛЕЖАЩИЮ ЧАСТЬ ПРИ ЧАСТИЧНОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ ПЛАЦЕНТЫ

- А) рядом с плодным пузырем плацентарная ткань
- Б) мясистая ткань
- В) плодный пузырь
- Г) головка

173. НОРМАЛЬНАЯ КОЛИЧЕСТВО ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД ПРИ ДОНОШЕННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ

- А)0,5-1,5 литра
- Б) 5 -6литров
- В) более 6 литров
- Г) 3-4литра

174.К ОСНОВГОМУ ПРИЗНАКУ АНАТОМИЧЕСКОГО УЗКОГО ТАЗА ОТНОСИТСЯ

- А) уменьшенный размер наружной конъюгаты
- Б) маленький размер индекса Соловьева
- В) крупное телосложение
- Г) рост беременной 150см

175. СЕРДЦЕБИЕНИЕ ПЛОДА ПРИ 1 ПОЗИЦИИ ВЫСЛУШИВАЕТСЯ

- А) слева от пупка
- Б) над лоном
- В) справа от пупка
- Г) выше пупка

176. ДИСТАНЦИЯ СПИНАРУМ РАВНА В (см)

- А) 25-26
- Б) 28-29
- В) 30-31
- Г) 20-21

177. ДИСТАНЦИЯ ТРОХАНТЕРИКА РАВНА В (см)

- А) 30-31
- Б) 20-21
- В) 25-26
- Г) 28-29

178. РАЗМЕР НАРУЖНОЙ КРНЫЮГАТЫ В (см)

- А) 20-21
- Б) 28-29
- В) 30-31
- Г) 25-26

179. В СОСТАВ ПОСЛЕДА ВХОДИТ

- А) плацента, пуповина и оболочка плода
- Б) плаценты и оболочки
- В) плацента и пуповина
- Г) плацента

180. СИМПТОМЫ ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ КЛИНИЧЕСКИ УЗКОГО ТАЗА

- А) правильно выраженная конфигурация головки, продолжительные роды
- Б) нарушение сердцебиение плода
- В) симптом Вастена «вровень»
- Г) внутриутробная гипоксия плода

181. ГРАВИ – ТЕСТ ОСНОВАН НА

- А) определении хорионгонадотропина
- Б) определение скрытых отеков
- В) определения срока овуляции
- Г) определение эксрадиола в моче

182. ФСГ ВЫРОБАТЫВАЕТСЯ В

- А) передней доле гипофиза
- Б) плаценте
- В) яичниках
- Г) гипоталамусе

183. ЗА РАЗВИТИЕ ФОЛЛИКУЛОВ В ЯИЧНИКАХ ОТВЕТСТВЕННЫ ГОРМОНЫ

- А) ФСГ
- Б) релизинг фактор ФСГ
- В) эстрогены
- Г) пролактин

184. МЕСТО ВЫСЛУШИВАНИЯ ПЛОДА ПРИ 2 ПОЗИЦИИ

- А) справа от пупка
- Б) выше пупка
- В) над лоном
- Г) слева от пупка

185. ПОЛОЖЕНИЕ ПЛОДА – ЭТО

- А) отношение оси плода к длиннику матки
- Б) отношение спинки плода к фронтальной плоскости
- В) отношение оси плода к поперечнику матки
- Г) отношение спинки плода к сагиттальной плоскости

186. ПРАВИЛЬНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ПЛОДА СЧИТАЕТСЯ

- А) продольное
- Б) косое
- В) поперечное с головкой плода, обращенной вправо
- Г) поперечное с головкой плода, обращенной влево

187. ПОЗИЦИЯ ПЛОДА ПРИ ПОПЕРЕЧНОМ ПОЛОЖЕНИИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО

- А) головки
- Б) мелких частей
- В) тазового конца
- Г) спинки

188. ПРЕДЛЕЖАНИЕ ПЛОДА – ЭТО ОТНОШЕНИЕ

- А) крупной части плода ко входу в малый таз
- Б) тазового конца плода ко входу в малый таз
- В) головка плода ко входу в таз
- Г) головка плода ко дну матки

189. ПЕРВЫЙ ПРИЕМ НАРУЖНОГО АКУШЕРСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

- А) высота стояния дна матки
- Б) предлежащая часть
- В) вид плода
- Г) позиция плода

190. ОКРУЖНОСТЬ ЖИВОТА ИЗМЕРЯЕТСЯ НА

- А) уровне пупка
- Б) середине расстояния между пупком и мечевидным отростком
- В) 3 поперечных пальца ниже пупка
- Г) середине расстояния между пупком и лонным сочленением

191. ИСТИННАЯ КОНЪЮГАТА – ЭТО РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ

- А) наиболее выступающим внутрь точками симфиза и мысом
- Б) нижним краем симфиза и выступающей точкой мыса
- В) верхним краем симфиза
- Г) серединой верхнего края лонного сочленения и мысом

192. ДОСТОВЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) сердцебиение плода
- Б) диспепсическое нарушение
- В) отсутствие менструации
- Г) увеличение размеров матки

193. ДЛЯ ТАЗОВОГО ПРЕДЛЕЖАНИЯ ПРИ НАРУЖНОМ АКУШЕРСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ НЕ ХАРАКТЕРНО

- А) баллотирующая часть над входом в малый таз
- Б) низкое расположение дна матки
- В) баллотирующая часть в не матки
- Г) высокое расположение дна матки

194. КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕЛОЙ ОСТРОЙ ГИПОКСИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) аритмия
- Б) глухость тонов сердца плода
- В) сердцебиение плода 120-140 уд. мин
- Г) сердцебиение плода 100-110 уд. Мин

195. ТЯЖЕСТЬ ТОКСИКОЗА 1 –Й ПОЛОВИНЫ БЕРЕМЕННОСТИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- А) ацетонурией
- Б) гипертензией
- В) диареей
- Г) увеличение массы тела

196. ПРИ ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ НОВОРОЖДЕННОГО НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ

- А) состояние зрачков
- Б) сердцебиение
- В) мышечный тонус
- Г) дыхание

197. ПРИ ДЛИТЕЛЬНОСТИ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА 28 ДНЕЙ ЕГО СЛЕДУЕТ СЧИТАТЬ

- А) нормопонирующим
- Б) антепонирующим
- В) гипопонирующим
- Г) постпонирующим

198. ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ПОЗДНЕГО ГЕСТОЗА БЕРЕМЕННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) гипертоническая болезнь
- Б) возраст первородящей 25 лет
- В) поперечное положение плода
- Г) вторая беременность

199. ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ РАННИХ СРОКОВ БЕРЕМЕННОСТИ НАИБОЛЕЕ ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ

- А) оценка вероятных признаков беременности
- Б) интерпретация данных влагалищного исследования
- В) проведение иммунологических тестов на беременность
- Г) оценка сомнительных признаков беременности

200. НАЛИЧИЕ АКТИВНОГО РЕВМАТИЗМА ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ

- А) ухудшает прогноз ее течения
- Б) не влияет на ее исход
- В) облегчает ее течение
- Г) не является фактором риска гестоза

201. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НОРМАЛЬНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ

- А) 280 дней
- Б) 380 дней
- В) 250 дней
- Г) 320 дней

202. РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПЕРИОД ЖЕНЩИНЫ ВКЛЮЧАЕТ ПЕРИОД

- А) наиболее благоприятный для зачатия, вынашивания и рождения ребенка
- Б) полового созревания
- В) угасания детородной функции
- Г) полового покоя

203. В ПУБЕРТАТНОМ ПЕРИОДЕ ДЕВОЧКИ ПОЛОВАЯ СИСТЕМА

- А) активно развивается
- Б) полностью развита
- В) находится в состоянии покоя
- Г) угасает

204.ЖЕНЩИНЕ ПОСЛЕ РОДОВ С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЖИТЬ ПОЛОВОЙ ЖИЗНЬЮ В ТЕЧЕНИИ

- А) 1,5-2-х месяцев
- Б) 3-х недель
- В) 2-х недель
- Г) 10-ти дней

205.ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ВУЛЬВОВАГИНИТА У ДЕВОЧЕК ЯВЛЯЕТСЯ

- А) несоблюдение правил личной гигиены
- Б) умеренная физическая активность
- В) переохлаждение
- Г) аномалия развития

206.К ПРОЯВЛЕНИЮ КЛИМАКТЕРИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ У ЖЕНЩИНЫ ОТНОСИТСЯ

- А) нарушение менструального цикла
- Б) увеличение веса
- В) боль в животе
- Г) снижение аппетита

207.ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НОРМАЛЬНОЙ МЕНСТРУАЦИИ У ЖЕНЩИНЫ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 7-8 дней
- Б) 3-5 дней
- В) 6-10 дней
- Г) 1-2 дня

208.ОСНОВНЫМ ФАКТОРОМ, ВЛИЯЮЩИМ НА ВОСПРИИМЧИВОСТЬ К ИНФЕКЦИЯМ, СВЯЗАННЫМ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (ИСМП), ЯВЛЯЕТСЯ

- А) множество лечебно-диагностических процедур
- Б) возраст человека
- В) антропометрические показатели
- Г) пол человека

209.САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ - ЭТО

- А) комплекс организационных и санитарно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения, распространения и ликвидацию инфекционных заболеваний среди пациентов и персонала
- Б) строгое соблюдение и регулярный контроль над выполнением требований асептики и антисептики
- В) комплекс мероприятий, направленный на уничтожение болезнетворных микроорганизмов
- Г) меры предосторожности при работе с пациентами в медицинских организациях

210.ИНФЕКЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, РАЗВИВАЮТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ

- А) источника инфекции, факторов передачи, восприимчивого человека
- Б) источника инфекции и восприимчивого человека
- В) источника инфекции, механизмов передачи
- Г) источника инфекции

211.ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ ВОЗБУДИТЕЛЯМИ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ЯВЛЯЮТСЯ

- А) условно-патогенные микроорганизмы
- Б) бактерии, которые свободно живут в окружающей среде
- В) платяные вши
- Г) вирусы

212.ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ И ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТИ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА ВЫДЕЛЕНИЕ ЖИДКОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО

- А) почками
- Б) кожей
- В) легкими
- Г) желудочно-кишечным трактом

213. ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПОДРОСТКОВОГО АЛКОГОЛИЗМА МОЖНО РЕКОМЕНДОВАТЬ
- А) убедить подростка и его окружение, что употребление алкоголя не является признаком взрослости
 - Б) направить подростка на цикл лекций о вреде алкоголизма
 - В) при встрече с подростком, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, сделать ему внушения о вреде алкоголя
 - Г) публично высмеять подростка после алкогольного эксцесса
214. К ЧИСЛУ СОЦИАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ТОКСИКОМАНИЙ МОЖНО ОТНЕСТИ
- А) злоупотребление чаем и кофе
 - Б) употребление галлюциногенов
 - В) злоупотребление слабоалкогольными напитками
 - Г) табакокурение
215. САМООБСЛЕДОВАНИЕ ЯИЧЕК ПРОВОДИТСЯ С ЦЕЛЮ
- А) уменьшением подвижности
 - Б) увеличением двигательной активности с уменьшением мышечных усилий
 - В) определением достижения половой зрелости
 - Г) пониженной двигательной активностью с уменьшением мышечных усилий
216. ГИПОДИНАМИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
- А) пониженной двигательной активностью с уменьшением мышечных усилий
 - Б) уменьшением подвижности
 - В) уменьшением объема движений
 - Г) увеличением двигательной активности с уменьшением мышечных усилий
217. ГИПОКИНЕЗИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
- А) уменьшением подвижности
 - Б) увеличением двигательной активности с уменьшением мышечных усилий
 - В) уменьшением объема движений
 - Г) пониженной двигательной активностью с уменьшением мышечных усилий
218. АДЕКВАТНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА ОБЕСПЕЧИВАЕТ
- А) повышение тонуса мышц, усиление мышц
 - Б) перестройку жирового обмена в сторону увеличения содержания в организме жировой ткани
 - В) уменьшение потребности в пище
 - Г) снижение приспособительных и компенсаторных реакций
219. ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ СПОСОБСТВУЕТ
- А) поддержанию обмена веществ на оптимальном уровне
 - Б) перестройке жирового обмена в сторону увеличения содержания в организме жировой ткани
 - В) уменьшению потребности в пище
 - Г) снижению приспособительных и компенсаторных реакций
220. ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ СПОСОБСТВУЮТ
- А) большей устойчивости организма к стрессам
 - Б) снижению приспособительных и компенсаторных реакций
 - В) перестройке жирового обмена в сторону увеличения содержания в организме жировой ткани
 - Г) уменьшению потребности в пище
221. ДЕЙСТВИЕ АНДРОГЕНОВ НА ОРГАНИЗМ ЖЕНЩИНЫ ПРОЯВЛЯЕТСЯ В
- А) росте волос на лобке и в подмышечных впадинах
 - Б) задержке в организме жидкости
 - В) развитии молочных желез
 - Г) стимуляции роста матки
222. ДЕЙСТВИЕ ЭСТРОГЕНОВ НА ОРГАНИЗМ ЖЕНЩИНЫ ПРОЯВЛЯЕТСЯ В
- А) развитие молочных желез
 - Б) развитию мускулатуры
 - В) росте волос на лобке и в подмышечных впадинах
 - Г) повышении уровня холестерина в крови

223.ДЕЙСТВИЕ АНДРОГЕНОВ НА ОРГАНИЗМ МУЖЧИНЫ ПРОЯВЛЯЕТСЯ В

- А) формировании вторичных половых признаков
- Б) увеличении грудных желез в периоде полового созревания
- В) формировании вкусовых ощущений
- Г) снижение порога болевой чувствительности

224. ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ

- А) защитить пациента от психофизических страданий и болей
- Б) ускорить процесс
- В) оградить пациента от родственников
- Г) оградить пациента от проблем

225.ИССЛЕДОВАНИЕ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА НОВООБРАЗОВАНИЕ НАЧИНАЮТ С

- А) маммографии
- Б) флюорографии
- В) пункционной биопсии
- Г) самообследования

226.В НОРМЕ У ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА ПУЛЬС СОСТАВЛЯЕТ УДАРОВ В МИНУТУ

- А) 60 -80
- Б) 55 – 60
- В) 85 – 90
- Г) 100 - 120

227.УЧАЩЕНИЕ ПУЛЬСА БОЛЕЕ 85 – 90 УДАРОВ В МИНУТУ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) тахикардией
- Б) брадикардией
- В) асистолией
- Г) гипертонией

228.АРТЕРИАЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) давление, которое образуется в артериальной системе организма при сокращениях сердца и зависит от сложной нервно-гуморальной регуляции, величины и скорости сердечного выброса, частоты и ритма сердечных сокращений и сосудистого тонуса
- Б) давление, которое образуется в артериальной системе организма при сокращениях сердца
- В) величина и скорость сердечного выброса
- Г) частота и ритм сердечных сокращений

229.ПУЛЬСОВОЕ ДАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ

- А) разницу между систолическим и диастолическим давлением
- Б) частоту сердечных сокращений
- В) сумму систолического и диастолического давления
- Г) давление, возникающее в артериях в момент максимального подъема пульсовой волны после систолы желудочков

230.ПУЛЬСОВОЕ ДАВЛЕНИЕ В НОРМЕ СОСТАВЛЯЕТ ____ ММ РТ.СТ.

- А) 30 - 50
- Б) 10 - 20
- В) 60 – 70
- Г) 20 - 40

231.ЧАСТОТОЙ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ (ЧДД) НАЗЫВАЕТСЯ

- А) количество циклов вдох-выдох за 1 минуту
- Б) количество выдохов за 1 минуту
- В) чередование вдоха и выдоха
- Г) количество вдохов за 1 минуту

232. У ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА НОРМА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ В ПОКОЕ СОСТАВЛЯЕТ В МИНУТУ

- А) 16 - 20
- Б) 40 – 45
- В) 12 - 16
- Г) 30 – 35

233. КОЛИЧЕСТВО ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ МЕНЬШЕ 16 В МИНУТУ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) брадипноэ
- В) ортопноэ
- Б) тахипноэ
- Г) апноэ

234. КОЛИЧЕСТВО ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ БОЛЬШЕ 20 В МИНУТУ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) тахипноэ
- В) апноэ
- Б) брадипноэ
- Г) ортопноэ

235. СУТОЧНЫМ ДИУРЕЗОМ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) общее количество мочи, выделенной пациентом в течение суток
- Б) соотношение между количеством введенной в организм жидкости и количеством выделенной жидкости из организма в течение суток
- В) процесс образования и выделения мочи
- Г) общее количество введенной в организм жидкости за сутки

236. СУТОЧНЫЙ ДИУРЕЗ У ВЗРОСЛЫХ СОСТАВЛЯЕТ

- А) от 800 мл до 2000 мл
- В) от 500 мл до 800 мл
- Б) от 200 мл до 500 мл
- Г) от 2000 мл до 3000 мл

237. ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ОПУЩЕНИЯ И ВЫПАДЕНИЯ ВЛАГАЛИЩА ЖЕНЩИНАМ РЕКОМЕНДУЮТ ВОЗДЕРЖИВАТЬСЯ ОТ

- А) чрезмерных физических нагрузок, подъема тяжестей
- В) беременности
- Б) занятий физкультурой
- Г) приема мясной пищи

238. НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЁННЫМ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМ НОВООБРАЗОВАНИЕМ У ЖЕНЩИН ЯВЛЯЕТСЯ РАК

- А) молочной железы
- В) прямой кишки
- Б) шейки матки
- Г) тела матки

239. ДОЛГ - это

- А) требование совести
- Б) приказ руководителя
- В) обоюдная выгода
- Г) требования близких людей

240. ЗНАЧЕНИЕ ТЕРМИНА «ДЕОНТОЛОГИЯ»

- А) совокупность профессиональных правил поведения
- Б) обязательства перед преподавателями, коллегами, учениками
- В) исполнение законодательства
- Г) завоевание социального доверия личности

241. СПОСОБНОСТЬ К СОПЕРЕЖИВАНИЮ И СОЧУВСТВИЮ

- А) эмпатия
- В) аффилиация
- Б) симпатия
- Г) альтруизм

242. ИСКУССТВЕННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ПО МЕДИЦИНСКИМ ПОКАЗАНИЯМ ПРОВОДИТСЯ

- А) независимо от срока беременности
- В) на сроке до 6 недель
- Б) на сроке до 12 недель
- Г) до 22 недель

243. ИСКУССТВЕННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ПОКАЗАНИЯМ ПРОВОДИТСЯ

- А) до 22 недель
- В) на сроке до 12 недель
- Б) на сроке до 6 недель
- Г) независимо от срока беременности

244. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО СТАТЬЕ 123 УК РФ «НЕЗАКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО АБОРТА» НАСТУПАЕТ ЗА

- А) производство аборта лицом, не имеющим высшего медицинского образования соответствующего профиля
- Б) производство аборта при отсутствии медицинских или с показаний для искусственного прерывания беременности
- В) производство аборта без согласия женщины
- Г) нарушение лицом, имеющим высшее медицинское образование соответствующего профиля, требований нормативных правовых актов при производстве аборта

245. ПРИ ИСКУССТВЕННОМ ОПЛОДОТВОРЕНИИ ОТЦОМ РЕБЕНКА ЗАПИСЫВАЕТСЯ

- А) муж женщины
- Б) донор
- В) донор или муж женщины
- Г) никто не записывается

246. СУРРОГАТНОЙ МАТЕРЬЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ ЖЕНЩИНА, ОТВЕЧАЮЩАЯ СЛЕДУЮЩИМ ТРЕБОВАНИЯМ

- А) наличие собственного здорового ребенка, отсутствие отклонений в состоянии здоровья, возраст 20 - 35 лет
- Б) отсутствие отклонений в состоянии здоровья, возраст 20 - 35 лет
- В) отсутствие отклонений в состоянии здоровья, возраст 18 - 45 лет
- Г) наличие не менее двух собственных детей, отсутствие отклонений в состоянии здоровья, возраст до 40 лет

247. ЖЕНЩИНА, СОСТОЯЩАЯ В БРАКЕ, МОЖЕТ СТАТЬ СУРРОГАТНОЙ МАТЕРЬЮ ПРИ УСЛОВИИ

- А) письменного согласия супруга
- Б) устного согласия супруга
- В) оформления развода
- Г) материальной выгоды

248. СПЕЦОДЕЖДУ МЕДПЕРСОНАЛА В АКУШЕРСКИХ ОТДЕЛЕНИЯХ СЛЕДУЕТ МЕНЯТЬ

- А) ежедневно и при загрязнении
- Б) 1 раз в неделю и при загрязнении
- В) 2 раза в неделю и при загрязнении
- Г) 1 раз в 2 дня при загрязнении

249. ИСКУССТВЕННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ПО ЖЕЛАНИЮ ЖЕНЩИНЫ ПРОВОДИТСЯ

- А) на сроке до 12 недель
- Б) на сроке до 6 недель
- В) до 22 недель
- Г) независимо от срока беременности

250. В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИМЕНЕНИЕ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА

- А) разрешено при соблюдении определенных условий
- Б) запрещено
- В) разрешено без ограничений
- Г) разрешено только при диагностике бесплодия

251. ДИСФУНКЦИОНАЛЬНОЕ МАТОЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ - ЭТО:

- А) кровотечение при дисфункции гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы
- Б) кровотечение при опухоли матки
- В) кровотечение при аденомиозе

252. СЛУЖАТ ЛИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ПРИ ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ ТЯЖЕЛОЕ СОСТОЯНИЕ БОЛЬНОЙ, ПАДЕНИЕ АД И СЕРДЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЭКСТРЕННОГО ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА?

- А) нет
- Б) да
- В) не всегда

253. ЛЕЧЕНИЕ АНЕМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ АПОПЛЕКСИИ ЯИЧНИКА:

- А) хирургическое
- Б) применение антипростагландинов
- В) антибактериальное

254. ПРИ РАЗРЫВЕ МАТОЧНОЙ ТРУБЫ КРОВЬ СКАПЛИВАЕТСЯ:

- А) в дугласовом пространстве
- Б) в переднем своде влагалища
- В) во влагалище

255. ПРИ ТРУБОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ МЕНСТРУАЦИИ:

- А) отсутствуют
- Б) циклические
- В) нерегулярные

256. СИМПТОМЫ ТРУБНОГО АБОРТА:

- А) схваткообразные боли внизу живота
- Б) внутреннее кровотечение
- В) метеоризм

257. ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МИОМЫ МАТКИ:

- А) доброкачественная гормонально-зависимая опухоль
- Б) склонна к малигнизации
- В) часто встречается в пубертатном возрасте
- Г) все выше перечисленное верно

258. ГИПЕРПОЛИМЕНОРЕЯ, ХРОНИЧЕСКАЯ АНЕМИЯ, БЕСПЛОДИЕ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ:

- А) эндометриоза
- Б) метрэндометрита
- В) туберкулеза гениталий
- Г) миомы матки

259. ФИБРОМИОМА РАСТЕТ ПРИ:

- А) высоком содержании эстрогенов
- Б) низком содержании прогестерона
- В) высоком содержании прогестерона
- Г) низком содержании всех гормонов

260. ОСНОВНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СИМПТОМ ПОДСЛИЗИСТОЙ МИОМЫ МАТКИ:

- А) меноррагия
- Б) альгодисменорея
- В) хроническая тазовая боль
- Г) вторичное бесплодие

261. БОЛИ ПЕРЕД И ВО ВРЕМЯ МЕСЯЧНЫХ, КРОВЯНИСТЫЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ДО И ПОСЛЕ МЕСЯЧНЫХ, БЕСПЛОДИЕ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ:

- А) эндометрита
- Б) туберкулеза гениталий
- В) полипа шейки матки
- Г) миомы матки

262. ПРОГРЕССИРУЮЩИЙ АТРОФИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ВУЛЬВЫ, ТРЕЩИНЫ, ИЗЪЯЗВЛЕНИЯ, ЗУД ВУЛЬВЫ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ:

- А) лейкоплакии
- Б) остроконечных кондилом
- В) рака
- Г) эктопии шейки матки

263. РАК ШЕЙКИ МАТКИ ЧАЩЕ ВОЗНИКАЕТ:

- А) при лейкоплакии шейки матки с дисплазией
- Б) при эрозии шейки матки
- В) у нерожавших женщин
- Г) при истмико-цервикальной недостаточности

264. ЗУД, ОБИЛЬНОЕ ТВОРОЖИСТОЕ ВЫДЕЛЕНИЕ ИЗ ПОЛОВЫХ ПУТЕЙ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ:

- А) кандидамикоза
- Б) гонореи
- В) хламидиоза
- Г) трихомониаза

265. УЧАЩЕННОЕ БОЛЕЗНЕННОЕ МОЧЕИСПУСКАНИЕ, ЖЖЕНИЕ, ГНОЙНЫЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ИЗ ПОЛОВЫХ ПУТЕЙ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ:

- А) гонореи
- Б) трихомониаза
- В) молочницы
- Г) сифилиса

266. ВОСХОДЯЩАЯ ГОНОРЕЯ – ЭТО ПОРАЖЕНИЕ:

- А) маточных труб
- Б) канала шейки матки
- В) уретры
- Г) парауретральных желез

267. ВТОРУЮ СТЕПЕНЬ ЧИСТОТЫ ВЛАГАЛИЩНОГО СОДЕРЖИМОГО ХАРАКТЕРИЗУЕТ:

- А) единичные лейкоциты
- Б) палочки додерлейна
- В) лейкоциты в большом количестве
- Г) щелочная среда

268. У ЖЕНЩИН ДЕТОРОДНОГО ВОЗРАСТА ГОНОКОКК ПОРАЖАЕТ:

- А) цервикальный канал
- Б) влагалище
- В) вульву
- Г) матку

269. ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫЙ ПУТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГОНОРЕИ:

- А) гематогенный
- Б) лимфогенный
- В) контактный
- Г) интраканаликулярный

270. ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ НОРМАЛЬНОЙ СРЕДЫ ВЛАГАЛИЩНОГО СОДЕРЖИМОГО НЕОБХОДИМО:

- А) достаточное содержание эстрогенов в организме
- Б) обильные слизистые выделения
- В) кокковая влагалищная флора
- Г) отсутствие половой жизни

271. ФУНКЦИЯ МАТКИ:

- А) менструальная
- Б) секреторная
- В) выделительная

272. НАРУЖНАЯ ОБОЛОЧКА МАТКИ:

- А) периметрий
- Б) параметрий
- В) миометрий

273. НОРМАЛЬНАЯ ФЛОРА ВЛАГАЛИЩА:

- А) палочки дедрейца
- Б) эпителиальные клетки
- В) кишечные палочки

274. В ЯИЧНИКАХ ОБРАЗУЮТСЯ:

- А) яйцеклетка и женские половые гормоны
- Б) сперматозоиды
- В) ферменты

275. СЛИЗИСТАЯ МАТОЧНЫХ ТРУБ ВЫСТЛАНА ЭПИТЕЛИЕМ:

- А) мерцательным
- Б) многослойным плоским
- В) кубический

276. ФУНКЦИИ ЯИЧНИКОВ:

- А) эндокринно-гормональная
- Б) выделительная
- В) защитная

277. КРУГЛЫЕ СВЯЗКИ МАТКИ ОТКЛОНЯЮТ МАТКУ:

- А) кверху, кпереди
- Б) кзади, книзу
- В) кзади

278. МАТОЧНАЯ АРТЕРИЯ ОТХОДИТ ОТ:

- А) внутренней подвздошной артерии
- Б) наружной подвздошной артерии
- В) аорты

279. ВАЖНУЮ РОЛЬ В РЕГУЛЯЦИИ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА ИГРАЮТ:

- А) гипоталамо-гипофизарная система
- Б) поджелудочная железа
- В) щитовидная железа

280. ПЕРВАЯ МЕНСТРУАЦИЯ У ДЕВОЧЕК (МЕНАРХЕ) В НОРМЕ НАЧИНАЕТСЯ В ВОЗРАСТЕ:

- А) 11-13 лет
- Б) 16-17 лет
- В) 8-9 лет

281. ПРИ РАЗРЫВЕ МАТОЧНОЙ ТРУБЫ КРОВЬ СКАПЛИВАЕТСЯ:

- А) в Дугласовом пространстве
- Б) в переднем своде влагалища
- В) во влагалище

282. ПРИ ТРУБНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ МЕНСТРУАЦИИ:

- А) отсутствуют
- Б) циклические
- В) ациклические

283. СИМПТОМЫ ТРУБНОГО АБОРТА:

- А) схваткообразные боли внизу живота
- Б) внутреннее кровотечение
- В) метеоризм

284. ПРЕРЫВАНИЕ ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ ЧАЩЕ ПРОИСХОДИТ НА СРОКЕ:

- А) 5-6 недель
- Б) 2-3 недели
- В) 10-12 недель

285. ПРИ ШЕЕЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ ШЕЙКА МАТКИ:

- А) бочкообразной формы
- Б) в норме
- В) округлой формы

286. ТРУБНЫЙ АБОРТ ВОЗНИКАЕТ ПРИ ИМПЛАНТАЦИИ ПЛОДНОГО ЯЙЦА, В ЧАСТИ МАТОЧНОЙ ТРУБЫ:

- А) ампулярной
- Б) интерстициальной:
- В) истмической

287. ИСКУССТВЕННЫЙ АБОРТ - ЭТО ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ НА СРОКЕ ДО:

- А) 12 недель
- Б) 15 недель
- В) 10 недель

288. ПРИВЫЧНЫЙ ВЫКИДЫШ – ЭТО АБОРТ:

- А) самопроизвольный два или более раз
- Б) по медицинским показаниям
- В) на раннем сроке беременности

289. СИМПТОМЫ УГРОЖАЮЩЕГО ВЫКИДЫША:

- А) повышение тонуса матки, боли в животе
- Б) изменение сердцебиения плода
- В) отсутствие роста матки

290. ЧТО ТАКОЕ ПОЛИМЕНОРЕЯ?

- А) интервал между месячными менее 21 дня
- Б) обильные менструации
- В) интервал между месячными более 35 дней

291. ЛЕЧЕНИЕ СИНДРОМА ШИХАНА ВКЛЮЧАЕТ:

- А) заместительную гормонотерапию
- Б) химиотерапию
- В) хирургическое лечение

292. ИЗ КАКОЙ ТКАНИ РАЗВИВАЕТСЯ МИОМА МАТКИ?

- А) мышечная
- Б) лимфоидная
- В) эпителиальная

293. ТАКТИКА ВРАЧА ПРИ БЕССИМПТОМНОЙ МИОМЕ МАТКИ У ЖЕНЩИНЫ 36 ЛЕТ, ЕСЛИ РАЗМЕРЫ ОПУХОЛИ ДО 20 НЕДЕЛЬ БЕРЕМЕННОСТИ?

- А) оперативное лечение
- Б) наблюдение
- В) гормонотерапия

294. ПОЧЕМУ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮТСЯ ЗАПУЩЕННЫЕ ФОРМЫ РАКА ЯИЧНИКОВ;

- А) позднее обращение больных из-за малосимптомности заболевания
- Б) быстрое развитие болезни
- В) низкий охват проф. осмотрами

295. ДИСПЛАЗИЯ ШЕЙКИ МАТКИ – ЭТО:

- А) предрак
- Б) фоновое заболевание
- В) воспаление

296. НА КАКОЙ СРОК ВВОДЯТ ВМК?

- А) согласно инструкции
- Б) на 2 года
- В) на 1 год

297. НАИБОЛЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОЙ КОНТРАЦЕПЦИЕЙ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ ЯВЛЯЕТСЯ:

- А) КОК + презервативы
- Б) ВМК
- В) презервативы

298. У БОЛЬНОЙ ДИАГНОСТИРОВАННАЯ ПРОГРЕССИРУЮЩАЯ ВНЕМАТОЧНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ. ПОКАЗАНО:

- А) операция
- Б) консервативное противовоспалительное лечение
- В) гемотрансфузия

299. ПРИ ТЯЖЕЛОМ СОСТОЯНИИ БОЛЬНОЙ С ПРЕРВАВШЕЙСЯ ТРУБНОЙ БЕРЕМЕННОСТЬЮ ПОКАЗАНО:

- А) все перечисленное
- Б) безотлагательное удаление источника кровотечения (беременной трубы)
- В) немедленное переливание крови

300. РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ, ОПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ, ВКЛЮЧАЕТ:

- А) все перечисленное
- Б) ультразвуковую терапию
- В) электрофорез лекарственных средств

301.ГИПОЛАКТИЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) Снижение выработки молока в молочных железах
- Б) Воспаление молочной железы у женщин
- В) Непереносимость грудного молока у ребенка
- Г) Снижение потребности ребенка в грудном молоке

302.ГОРМОН СТИМУЛИРУЮЩИЙ РОСТ И СОЗРЕВАНИЯ ФОЛЛИКУЛ В ЯИЧНИКАХ

- А) Фолликулостимулирующий
- Б) Тиреотропный
- В) Лютеинизирующий
- Г) Адренокортикотропный

303. ЦИКЛИЧЕСКОЕ ОТТОРЖЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СЛОЯ ЭНДОМЕТРИЯ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) Менструация
- Б) Плацентация
- В) Овуляция
- Г) Имплантация

304. ОПЛОДОТВОРЕНИЕ ЯЙЦИКЛЕТКИ ПРОИСХОДИТ В

- А) Полости маточной трубы
- Б) Полости матки
- В) Полости малого таза
- Г) Канале шейки матки

305. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА СОСТАВЛЯЕТ

- А) 6-8 недель
- Б) Месяц
- В) Две недели
- Г) 1-2 дня

306. ПЕРВЫМ ПЕРИОДОМ РОДОВ СЧИТАНТСЯ ПЕРИОД
А) от начало родовой деятельности до раскрытия шейки матки
Б) от раскрытия шейки матки до изгнания плода
В) с момента рождения до рождения последа
Г) с момента отхождения околоплодных вод

307. ПРОЦЕСС ОБРАЗОВАНИЯ, НАКОПЛЕНИЯ И ВЫВЕДЕНИЯ ГРУДНОГО МОЛОКА
НАЗЫВАЕТСЯ
А) лактация
Б) саливация
В) пролиферация
Г) овуляция

308. К ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ МЕТОДАМ КОНТРАЦЕПЦИИ ОТНОСИТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
А) календарного метода
Б) спермицидов
В) презерватива
Г) внутриматочной спирали

309. ОДНИМ ИЗ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К ПРИМЕНЕНИЮ ХИМИЧЕСКОГО МЕТОДА
КОНТРАЦЕПУИИ ЯВЛЯЕТСЯ
А) эрозия шейки матки
Б) возраст старше 30 лет
В) пиелонифрит в стадии ремиссии
Г) наличие артериальной гипертензии

310. СРЕДСТВА ГОРМОНАЛЬНОЙ КОНТРАЦЕПЦИИ ОБЛАДАЮТ ДЕЙСТВИЕМ
А) подавление овуляции
Б) сгущение цервикальной слизи
В) снижение двигательной активности сперматозоидов
Г) уничтожение сперматозоидов

311. ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
А) 280 дней
Б) 220 дней
В) 240 дней
Г) 300 дней

312. ВО ВЛАГАЛИЩЕ ЗДОРОВОЙ ЖЕНЩИНЫ ПРЕОБЛАДАЕТ СРЕДА
А) кислая
Б) слабощелочная
В) нейтральная
Г) щелочная

313. СРЕДСТВОМ КОНТРАЦЕПЦИИ ,ЗАЩИЩАЮЩИМ ОТ ЗАБОЛЕВАНИЙ ,
ПЕРЕДАЮЩИМСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ, ЯВЛЯЕТСЯ
А) презерватив
Б) внутриматочная спираль
В) гормональные препараты
Г) диафрагма

314. В ЯИЧКЕ У МУЖЧИНЫ ВЫРОБАТЫВАЕТСЯ ГОРМОН
А) тестостерон
Б) прогестерон
В) эстроген
Г) пролактин

315. ПОРОКИ РАЗВИТИЯ ПЛОДА ВЫЗЫВАЕТ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПЕРЕНЕСЕННОЕ В РАННИЕ СРОКИ БЕРЕМЕННОСТИ

- А) краснуха
- Б) ревматизм
- В) пневмония
- Г) панкреатит

316. МЕНОПАУЗОЙ НАЗЫВАЮТ

- А) последнюю самостоятельную менструацию
- Б) период стабильной менструальной функции
- В) период наступления первой менструации
- Г) период времени после окончания репродуктивного возраста

317. К ПСИХОНЕВРАТИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЯМ СИНДРОМА ОТНОСЯТ

- А) плаксивость
- Б) жар
- В) приливы
- Г) нарушение сна

318. К ПРОФИЛАКТИКЕ ОСТЕОПОРОЗА ОТНОСЯТ

- А) адекватную физическую активность
- Б) употребления продуктов, богатых углеводами
- В) соблюдения режима питания
- Г) наблюдения у врача травматолога

319. ОДНИМ ИЗ НАИБОЛЕЕ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ИСККУСТВЕННОГО ПЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) бесплодие
- Б) нарушение менструального цикла
- В) многоплодная беременность
- Г) неправильное положение матки

320. ПРИЧИНОЙ АНДРОПАУЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) снижение выработки тестостерона
- Б) снижение функции щитовидной железы
- В) снижение выработки эстрогена
- Г) избыток пролактина

321. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПЕРЕОДИЧНОСТЬ ОСМОТРА ЖЕНЩИНЫ ВРАЧОМ-ГИНЕКОЛОГОМ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 1раз в год
- Б) 4раза в год
- В) 1раз в 2года
- Г) 2 раза в год

322. ВРЕМЯ ПОЛОВОГО СОЗРЕВАНИЯ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) пубертатным периодом
- Б) пренатальным периодом
- В) юношеским периодом
- Г) фертильнам периодом

323. НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРОБЛЕМОЙ В ПЕРИОД ПОЛОВОГО СОЗРЕВАНИЯ У ПОДРОСТКОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) эмоциональная неустойчивость
- Б) социализация
- В) появление вторичных половых признаков
- Г) физическая активность

324. ОДНИМ ИЗ ОСЛОЖНЕНИЙ ИСКУССТВЕННОГО ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, ПРИВОДЯЩЕГО К ТРУБНОМУ БЕСПЛОДИЮ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) воспаление маточных труб
- Б) кровотечение
- В) остатки плацентарной ткани
- Г) перфорация матки

325. ФОРМИРОВАНИЮ ВТОРИЧНЫХ ПОЛОВЫХ ПРИЗНАКОВ У ДЕВОЧЕК СПОСОБСТВУЕТ ГОРМОН

- А) эстрадиол
- Б) тироксин
- В) адреналин
- Г) инсулин

326. НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) контрацепция
- Б) прерванный половой акт
- В) аменорея
- Г) лактация

327. ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ПСИХОПРАФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БЕРЕМЕННОЙ К РОДАМ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) устранение психогенного компонента родовой деятельности
- Б) ознакомление с основами гигиены режима и питания беременных
- В) ознакомление беременных со строением и функциями половых органов
- Г) разъяснение влияния факторов внешней среды на течение беременности

328. ПИТАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ ОРГАНИЗМА И СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ, НАЗЫВАЕТСЯ

- А) рациональным
- Б) избыточным
- В) недостаточным
- Г) несбалансированным

329. РЕЗЕРВОМ ЭНЕРГИИ В ОРГАНИЗМЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- А) жиры
- Б) витамины
- В) углеводы
- Г) белки

330. ОСНОВНАЯ ФУНКЦИЯ УГЛЕВОДОВ

- А) энергетическая
- Б) обеспечения деятельности желудочно-кишечного тракта
- В) пластическая
- Г) растворение витаминов

331. ДЕФИЦИТ ЙОДА В РАЦИОНЕ ПИТАНИЯ В ЗРЕЛОМ ВОЗРАСТЕ ПРИВОДИТ К

- А) повышенной утомляемости
- Б) развитию остеопороза
- В) задержке физического развития
- Г) онкологическим заболеваниям

332. СОГЛАСНО РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПО ЗДОРОВОМУ ПИТАНИЮ, УЖИН ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ ПОЗДНЕЕ, ЧЕМ

- А) за 2-3 часа до сна
- Б) за 6 часов до сна
- В) за 1 час до сна
- Г) за 45 минут до сна

333. ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНО РАЗВИТИЕ АНЕМИИ

- А) железодифицитный
- Б) серповидно-клеточный
- В) гипопластический
- Г) гемолитический

334. ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА – ЭТО

- А) состояние полного физического, духовного и социального благополучия
- Б) состояние, при котором отсутствуют болезни, ограничивающие трудоспособность
- В) состояние активной деятельности при наличии минимальных функциональных нарушений
- Г) состояние его активной трудоспособности

335. ЗАБОТА О СОБСТВЕННОМ ЗДОРОВЬЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) обязанностью граждан
- Б) ответственностью человека перед обществом
- В) личным делом каждого гражданина
- Г) добровольным выбором гражданина

336. ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ

- А) путем проведения мероприятий, направленных на информирования граждан о факторах риска их здоровья
- Б) путем проведения рекламы специализированных видов питания
- В) путем проведения обязательной иммунопрофилактики
- Г) путем информирования о новых достижениях

337. ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ГРАЖДАН НАЧИНАЯ С ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ

- А) созданием условий для занятий физической культурой и спортом
- Б) путем информирования о новых достижениях в области лечения заболеваний
- В) путем проведения обязательной иммунопрофилактики
- Г) путем проведения рекламы специализированных видов питания

338. ЦЕЛЬ ОСМОТРА И ОБСЛЕДОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ ВРАЧАМИ-СПЕЦИАЛИСТАМИ, ВРАЧЕМ-ГИНЕКОЛОГОМ, ВРАЧЕМ-УРОЛОГОМ

- А) раннее выявление и профилактику развития заболеваний, которые приводят к нарушениям репродуктивной сферы
- Б) разработка программ оздоровления, лечения и реабилитации с учетом выявленных заболеваний
- В) динамическое диспансерное наблюдение за детьми группы риска
- Г) раннее выявление групп риска по развитию хронических заболеваний

339. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 1 раз в год
- Б) 1 раз в 3 месяца
- В) 1 раз в пол года
- Г) 1 раз в 2 года

340. МАРШРУТНАЯ КАРТА ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ(ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА) РАЗРАБОТАНА ДЛЯ

- А) пациента
- Б) врача, проводящего диспансеризацию
- В) медицинской сестры
- Г) контролирующего врача

341. ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ ОБЯЗАНЫ СОБЛЮДАТЬ

- А) все лица, которым сведения, составляющие врачебную тайну стали известны при выполнении профессиональных обязанностей
- Б) только должностные лица медицинской организации, имеющие свидетельство об аккредитации специалиста
- В) только медицинские работники, имеющие высшее медицинское образование и свидетельство об аккредитации специалиста
- Г) только медицинские и фармацевтические работники, имеющие высшее и среднее образование

342. С ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЕГО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РАЗГЛАШЕНИЕ ВРАЧЕБНОЙ ТАЙНЫ ДОПУСКАЕТСЯ

- А) в целях медицинского обследования и лечения пациента, проведения научных исследований, их опубликования в научных изданиях, использование в учебном процессе
- Б) только в целях осуществления уполномоченными федеральными органами исполнительной власти контроля с качеством и медицинской деятельности
- В) только в целях поведения медицинского обследования и лечения гражданина, который в результате своего состояния не способен выразить свою волю
- Г) только в целях информирования представителей страховых медицинских организаций

343. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ, БЕЗ СОГЛАСИЯ ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЕГО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДОПУСКАЕТСЯ В СЛУЧАЕ

- А) обмена информацией медицинскими организациями, в целях оказания медицинской помощи
- Б) письменного обращения адвоката при наличии нотариально оформленной доверенности на введение судебного дела
- В) письменного обращения представителей средств массовой информации при наличии аккредитации
- Г) письменного обращения близких родственников пациента, в случае его смерти

344. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ, БЕЗ СОГЛАСИЯ ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЕГО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИ

- А) угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и поражений
- Б) наличие письменного обращения близких родственников пациента, в случае его смерти
- В) наличие обращения представителей средств массовой информации, с разрешения руководителей медицинской организации
- Г) наличие письменного обращения адвоката, предоставившего нотариально оформленную доверенность на ведение судебного дела

345. ПО ЗАПРОСУ АДВОКАТА ИНФОРМАЦИЯ, СОСТАВЛЯЮЩАЯ ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ МОЖЕТ БЫТЬ РАЗГЛОШЕННА

- А) письменного согласия пациента на сообщение сведений, составляющих врачебную тайну
- Б) разрешение органа исполнительной власти ,осуществляющего контроль за качеством и безопасностью медицинской деятельности
- В) письменного разрешения лечащего врача и руководителей медицинской деятельности
- Г) разрешения руководителей медицинской организации и врачебной комиссии

346. ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ СОСТАВЛЯЮТ

- А) сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи , состояние его здоровье и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении
- Б) только сведения о состоянии здоровья и диагнозе гражданина, обратившегося за медицинской помощью и иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении
- В) сведение о состоянии здоровья и диагнозе гражданина, обратившегося за медицинской помощью и сведения о состоянии здоровья близких родственников пациента
- Г) только сведения о состоянии здоровья и диагнозе гражданина, обратившегося за медицинской помощью и сведения о состоянии здоровья законных представителей пациента

347. В НОРМЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРИОДА ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ ПЛОДА СОСТАВЛЯЕТ(В НЕДЕЛЯХ БЕРЕМЕННОСТИ)

- А) 40
- Б) 24
- В)32
- Г) 18

348. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА РАК ШЕКИ МАТКИ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ

- А) врача-онколога
- Б) врача-гинеколога
- В) врача-маммолога
- Г) врача-рентгенолога

349. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ПОСЛЕРОДОВЫЙ МАСТИТ РОДИЛЬНИЦУ НАПРАВЛЯЮТ К

- А) врачу- хирургу
- Б) врачу-гинекологу
- В) врачу-онкологу
- Г) врачу-венерологу

350. ДЛЯ ОКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТА ПЕРЕВОДЯТ В

- А) кардиологический центр
- Б) реанимационное отделение
- В) санаторий
- Г) больницу скорой медицинской помощи

351. САНИТАРНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ ДОЛЖНО НАЧИНАТЬСЯ

- А) до рождения ребенка
- Б) с первого года жизни
- В) в детском саду
- Г) в школе

352. ОСНОВНЫМ ФАКТОРОМ, КОТОРЫЙ ПРИВОДИТ К РОСТУ АБОРТОВ И РОДОВ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) плохая осведомленность о методах контрацепции
- Б) избыточное использование контрацептивов
- В) экологическая ситуация
- Г) широкая доступность информации о половом воспитании

353. ПРИВИВАТЬ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ ДЕТЯМ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ДОЛЖНЫ

- А) родители
- Б) медицинские работники
- В) воспитатели
- Г) учителя

354. СИСТЕМА МЕДИКО-ПЕДОГАГИЧЕСКИХ МЕР ПО ВОСПИТАНИЮ У ПОДРОСТКОВ ПРАВИЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К ВОПРОСАМ ПОЛА НАЗЫВАЕТСЯ

- А) половым воспитанием
- Б) социальным воспитанием
- В) гигиеническим воспитанием
- Г) санитарным воспитанием

355. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ГИГИЕНИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ПО ВОПРОСАМ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НЕОБХОДИМО ДЛЯ

- А) формирование общественного мнения
- Б) удовлетворения потребностей в здоровом образе жизни
- В) формирование умений
- Г) формирование навыков

356. ЛЕКЦИИ ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ МОЖЕТ ПРОВОДИТЬ

- А) врач, медицинская сестра
- Б) только врач
- В) только медицинская сестра
- Г) младший медицинский персонал

357. РОЖДЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ, ПОДГОТОВКА ИХ К ЖИЗНИ В ОБЩЕСТВЕ ОТНОСИТСЯ К ФУНКЦИИ СЕМЬИ

- А) репродуктивной
- Б) рекреативной
- В) хозяйственно-экономической
- Г) воспитательной

358. НЕЗАВИСИМОЕ СЕСТРИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРИ УГРОЗЕ ПРЕРАВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ

- А) создание покоя
- Б) проведение катетеризации
- В) назначение сокращающих средств
- Г) введение прогестерона, вызов врача

359. ОБСЛЕДОВАНИЕ ЖЕНЩИН ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА МЕДИЦИНСКИЙ АБОРТ ВКЛЮЧАЕТ

- А) анализ крови на RW, ВИЧ-инфекцию
- Б) анализ мочи по Нечипоренко
- В) исследование крови на холестерин
- Г) кальпоскопию

360. СЕСТРИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПАЦИЕНТА ПРИ ИНФЕКЦИЯХ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ

- А) сбор субъективной информации
- Б) рентгенологическое исследование
- В) бимануальное исследование
- Г) исследование мочи

361. НЕЗАВИСИМОЕ СЕСТРИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО

- А) подготовка пациентки к гинекологическому осмотру
- Б) введение газоотводной трубки
- В) введение гормонов
- Г) осмотр шейки матки

362. ЧИСЛО ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ У ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА

- А) 16-20 в минуту
- Б) 10-12 в минуту
- В) 12-14 в минуту
- Г) 22-24 в минуту

363. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПРАЗДНУЕТСЯ

- А) 12 мая
- Б) 17 июня
- В) 7 января
- Г) 25 октября

364. КОМПЕТЕНТНОСТЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ОЗНАЧАЕТ

- А) наличие знаний и опыта, необходимые для эффективной профессиональной деятельности
- Б) сохранение сведений о пациенте
- В) подчинение старшему по должности младшему
- Г) организация образа жизни пациентов, способствующую его выздоровлению

365. НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНЫМ ДЛЯ РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА СЧИТАЕТСЯ ВОЗРАСТ ЖЕНЩИНЫ(ЛЕТ)

- А) 20-25
- Б) 18-30
- В) 25-45
- Г) 25-35

366. СМЕНА ПОСТЕЛЬНОГО И НАТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ В СТАЦИОНАРЕ ПРАВОДИТСЯ ПЛАНОВО ОДИН РАЗ В

- А) 7 дней
- Б) день
- В) 2 недели
- Г) месяц

367. МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ МЕНЯЕТ ОДНОРАЗОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ МАСКМИ

- А) через 2 часа
- Б) через 6 часов
- В) 1 раз в смену
- Г) после каждой манипуляции

368. МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ МЕНЯЕТ ОДНОРАЗОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ПЕРЧАТКИ

- А) после каждой манипуляции
- Б) в конце рабочего дня
- В) не меняет, двукратно протирая спиртом
- Г) не меняет, однократно протирая спиртом

369. ПЛАНИРОВАНИЕМ СЕМЬИ ЗАНИМАЮТСЯ

- А) центры планирования семья
- Б) родильные дома
- В) смотровые кабинеты поликлиник
- Г) врач-гинеколог участковый

370. НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНАЯ СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ДИДЛОПРОИЗВОДСТВА В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ПРЕДПОЛОГАЮТ

- А) использование компьютерной информации
- Б) использование пишущих машинок
- В) учет в прошнурованных журналах
- Г) введение картотеки

371. ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦ, ПОСТУПАЮЩИХ В СТАЦИОНАР, ВЕДЕТСЯ

- А) журнал учета приема пациентов и отказов в госпитализацию ф001/у
- Б) листок учета движения больных и коечного фонда ф007/у
- В) медицинская карта стационарного больного ф003/у
- Г) статистическая карта выбывшего из стационара ф006/у

372. ИНФОРМИРОВАННЫМ ФАКТОРОМ, СПОСОБСТВУЮЩИМ РАЗВИТИЮ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ЯВЛЯЕТСЯ

- А) половозрастная принадлежность
- Б) употребления табака и алкоголя
- В) недостаточная физическая активность
- Г) несбалансированное питание

373. КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ, МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР ВРАЧАМИ НЕСКОЛЬКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И ПРИМЕНЕНИЯ НЕОБХОДИМЫХ МЕТОДОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

- А) диспансеризация
- Б) профилактика
- В) здоровье
- Г) политика

374. КОЛИЧЕСТВО ЭТАПОВ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ С 01.04.2015г. СЧИТАЕТСЯ

- А) 2
- Б) 10
- В) 5
- Г) 3

375. ЛИЦА, НЕ ТРЕБУЮЩИЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ, ОТНОСЯТСЯ К ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ

- А) 1
- Б) 3а
- В) 2
- Г) 3б

376. ВАКЦИНАЦИЯ В ПЕРВЫЕ ДНИ ЖИЗНИ ПРОВОДИТСЯ ПРОТИВ

- А) туберкулеза
- Б) дифтерии, коклюша, столбняка
- В) кори, ветряной оспы, краснухи
- Г) гриппа

377. ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

- А) определение состояния здоровья пациента
- Б) проведение лечебно-оздоровительных мероприятий
- В) проведение реабилитационных мероприятий
- Г) своевременное выявление инфекционных заболеваний

378. МАММОГРАФИЯ ПОСЛЕ 40 ЛЕТ ПРОВОДИТСЯ ЖЕНЩИНАМ

- А) 1 раз в 2 года
- Б) по показаниям
- В) 2 раза в год
- Г) ежегодно

379. РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ХРОНИЧЕСКИХ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

- А) проведении бесед по формированию здорового образа жизни
- Б) лечение заболеваний на ранних стадиях
- В) предупреждение рецидива заболевания
- Г) создание профилактических программ

380. ПРОФИЛАКТИКОЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) предупреждение абортов
- Б) лечение соматических заболеваний
- В) высококалорийное питание
- Г) низкокалорийное питание

381. МЕДИЦИНСКИЙ СКРИНИНГ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ РИСКА И РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРОВОДИТСЯ ПУТЕМ

- А) профилактических медицинских осмотров
- Б) проведение иммунопрофилактики
- В) проведение экологического и санитарно-гигиенического скрининга
- Г) привлечения населения к занятию физической культуры и спортом

382. НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ МОНИТОРИНГА ФАКТОРОВ РИСКА НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРОВОДЯТ

- А) анкетирование
- Б) физикальное исследование
- В) лабораторные исследования
- Г) инструментальные исследования

383. ПОПУЛЯЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- А) воздействием через средства массовой информации
- Б) снижение факторов риска
- В) выявление лиц с высоким уровнем фактором риска
- Г) ранней диагностикой заболевания

384. СТРАТЕГИЯ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- А) ранней диагностикой заболевания
- Б) выявлением лиц с высоким уровнем фактором риска
- В) снижение смертности
- Г) воздействием через средства массовой информации

385. НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ

- А) анкетирование
- Б) консультация врача-уролога
- В) сканирование брахицефальных артерий
- Г) консультация врача-хирурга

386. ПРОЦЕСС, ПРОЯВЛЯЮЩИЙСЯ В ВИДЕ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТОЯНИИ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА, НАЗЫВАЕТСЯ

- А) болезнь
- Б) заболеваемость
- В) предболезнь
- Г) адаптация

387. ГРАЖДАНЕ, У КОТОРЫХ НЕ УСТАНОВЛЕННЫ ХРОНИЧЕСКИЕ НЕИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ОТСУТСТВУЮТ ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ТАКИХ ЗАБОЛИВАНИЙ, ОТНОСЯТСЯ К

- А) 1 группе риска
- Б) 4 группе риска
- В) 3 группе риска
- Г) 2 группе риска

388. ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ВКЛЮЧАЮТ

- А) соблюдения принципов здорового образа жизни
- Б) консультирования по бесплодию
- В) выявления заболеваний репродуктивной системы
- Г) лечение бесплодия

389. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ И ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ИМ ПРЕДОПУХОЛЕВЫХ СОСТОЯНИЙ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) первичной профилактикой
- Б) третичной профилактикой
- В) вторичной профилактикой
- Г) медицинской профилактикой

390. ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВКЛЮЧАЕТ

- А) выявление и устранение предраковых заболеваний
- Б) соблюдение диеты
- В) регулярная физическая активность
- Г) нормализация массы тела

391. РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВАКЦИНАЦИИ ДОЛЖНО ПРИНИМАТЬСЯ

- А) пациентом на основе информированного согласия (в письменном виде) после ознакомления с полезными эффектами и возможными рисками процедуры
- Б) врачом в соответствии с индивидуальным графиком профилактических прививок, независимо от информированного согласия
- В) врачом в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, независимо от информированного согласия представителя пациента
- Г) медицинской сестрой на основе рекомендаций врача, согласно Национальному календарю профилактических прививок

392. АСЕПТИКА – ЭТО

- А) комплекс мероприятий, предупреждающих попадание микробов в рану
- Б) уничтожение болезнетворных микробов
- В) комплекс мероприятий, направленных на уничтожения микробов в ране
- Г) уничтожение всего живого

393. АНТИСЕПТИКА – ЭТО

- А) комплекс мероприятий, направленных на уничтожение микробов в ране, организме
- Б) комплекс мероприятия, предупреждающих попадание микробов в рану
- В) мероприятия по обеззараживанию помещений
- Г) уничтожение болезнетворных микробов

394.К ФИЗИЧЕСКОЙ АНТИСЕПТИКЕ ОТНОСИТСЯ

- А) дренирование раны
- Б) промывание раны антисептиком
- В) первичная хирургическая обработка паны
- Г) удаление некротических тканей из раны

395. СТЕРИЛИЗАЦИЯ –ЭТО

- А) удаление всех микроорганизмов , в том числе и спорообразующих
- Б) уничтожение патогенных микробов
- В) механическое удаление микроорганизмов с поверхности изделий медицинского назначения
- Г) комплекс мероприятий, предупреждающих появление микробов

396.ПРИЧИНА ИММУНОДИФИЦИТНОГО СОСТОЯНИЯ ПРИ ВИЧ – ИНФЕКЦИИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

- А) поражение Т –лимфоцитов
- Б) поражение В –клеток
- В) поражение эритроцитов
- Г) поражение моноцитов

397.К ИНФЕКЦИЯМ , СВЯЗАННЫМ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ(ИСМП), ОТНОСЯТ

- А) любое клиническое распознаваемое инфекционное заболевание или осложнение, у пациентов или медицинских работников, связанное с оказанием любых видов медицинской помощи
- Б) любое инфекционное заболевание, возникшее в стационаре
- В) инфекцию, передающуюся половы путем
- Г) любое клиническое распознаваемое инфекционное заболевание, с которым пациент поступил в стационар

398.СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ –ИНФЕКЦИИ

- А) половой
- Б) воздушно –капельный
- В) алиментарный
- Г) трансмиссивный

399. К УНИВЕРСАЛЬНЫМ МЕРАМ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИИ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОТНОСИТСЯ ПРАВИЛО

- А) считать каждого пациента потенциально инфицированным
- Б) мытья рук выполнением инвазивных манипуляций
- В) мытья рук перед уходом за тяжелобольными пациентами
- Г) использование антисептика для рук после инъекции

400.ГИГИЕНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ МЫТЬЯ РУК ПРЕДПОЛАГАЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЫТЬЕ РУК

- А) под проточной водой с мылом
- Б) под проточной водой с мылом с последующим одеванием перчаток
- В) достижение стерильности кистей рук на определенное время
- Г) антисептики